

RENSEIGNEMENTS SUR LE MÉDICAMENT POUR LE PATIENT

LISEZ CE DOCUMENT POUR ASSURER UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT

Pr **Dupixent**[®]

dupilumab injectable

solution pour injection sous-cutanée

DUPIXENT à 300 mg en seringue préremplie jetable (300 mg/2 ml) munie d'un protecteur d'aiguille, ou en stylo injecteur prérempli

DUPIXENT à 200 mg en seringue préremplie jetable (200 mg/1,14 ml) munie d'un protecteur d'aiguille, ou en stylo injecteur prérempli

Lisez ce qui suit attentivement avant de prendre **Dupixent** et lors de chaque renouvellement de prescription. L'information présentée ici est un résumé et ne couvre pas tout ce qui a trait à ce médicament. Discutez de votre état de santé et de votre traitement avec votre professionnel de la santé et demandez-lui s'il possède de nouveaux renseignements au sujet de **Dupixent**.

Pour quoi Dupixent est-il utilisé?

Dupixent est un médicament injectable sur ordonnance utilisé pour :

Dermatite atopique

- Pour traiter les patients âgés de 6 mois et plus atteints de dermatite atopique modérée à sévère, aussi appelée eczéma atopique. Dupixent peut être utilisé avec ou sans corticostéroïdes topiques.
- On ne sait pas si Dupixent est sécuritaire et efficace chez les enfants atteints de dermatite atopique âgés de moins de 6 mois.

Asthme

- En complément d'autres médicaments contre l'asthme pour le traitement d'entretien de l'asthme sévère de type 2/de phénotype éosinophilique ou nécessitant la prise de corticostéroïdes oraux chez les adultes, les adolescents et les enfants (6 ans et plus), lorsque leur asthme n'est pas maîtrisé par leurs médicaments actuels contre l'asthme. L'asthme éosinophilique sévère est un type d'asthme caractérisé par une hausse des éosinophiles dans le sang ou les poumons. Les éosinophiles sont un type de globules blancs associés à une inflammation des voies respiratoires pouvant aggraver votre asthme ou augmenter le nombre de crises d'asthme.
- On ne sait pas si Dupixent est sécuritaire et efficace chez les enfants asthmatiques âgés de moins de 6 ans.
- Dupixent n'est pas utilisé pour traiter les problèmes respiratoires d'apparition soudaine.

Rhinosinusite chronique avec polypes nasaux

- Pour traiter, en association avec des corticostéroïdes administrés par voie intranasale, la rhinosinusite chronique sévère avec polypes nasaux (RSC-PN) chez les adultes dont la maladie n'est pas bien maîtrisée par des corticostéroïdes à action générale ou une intervention chirurgicale.
- On ne sait pas si Dupixent est sécuritaire et efficace chez les enfants âgés de moins de 18 ans.

Œsophagite à éosinophiles

- Pour traiter l'œsophagite à éosinophiles (OE) chez les patients âgés d'un an et plus, pesant au moins 15 kg.

Prurigo nodulaire

- Traitement des patients adultes atteints de prurigo nodulaire (PN) modéré à sévère dont la maladie n'est pas adéquatement contrôlée par les traitements topiques prescrits ou lorsque ces traitements ne sont pas recommandés. Dupixent peut être utilisé avec ou sans corticostéroïdes topiques.
- On ne sait pas si Dupixent est sécuritaire et efficace chez les enfants âgés de moins de 18 ans.

Comment Dupixent agit-il?

Dupixent contient une substance active appelée dupilumab.

Le dupilumab est un anticorps monoclonal (un type de protéine spécialisée) qui bloque l'action des protéines inflammatoires appelées IL-4 et IL-13. Les IL-4 et IL-13 contribuent à l'apparition des signes et symptômes de la dermatite atopique, de l'asthme, de la rhinosinusite chronique avec polypes nasaux, de l'OE et du prurigo nodulaire.

L'utilisation de Dupixent pour la dermatite atopique peut améliorer l'état de votre peau et réduire les démangeaisons.

L'utilisation de Dupixent pour l'asthme éosinophilique sévère peut réduire les crises d'asthme sévères et améliorer votre respiration. Dupixent peut également aider à réduire la quantité de médicaments d'un autre groupe, corticothérapie orale (CSO) que vous devez prendre pour maîtriser votre asthme, tout en réduisant les crises d'asthme sévères et en améliorant votre respiration.

L'utilisation de Dupixent pour la RSC-PN peut réduire la taille des polypes nasaux, diminuer la congestion nasale et améliorer l'odorat.

L'utilisation de Dupixent pour l'OE peut améliorer les difficultés à avaler associées à la consommation d'aliments et peut réduire votre besoin de « faire passer » les aliments (p. ex., boire du liquide, tousser, vomir ou obtenir une aide médicale).

L'utilisation de Dupixent pour le prurigo nodulaire peut améliorer l'état de votre peau en réduisant les démangeaisons et améliorant les lésions.

Quels sont les ingrédients dans Dupixent?

Ingrédients médicinaux : dupilumab

Ingrédients non médicinaux : acide acétique, chlorhydrate de L-arginine, L-histidine, polysorbate 80, acétate de sodium, saccharose, eau pour injection.

Dupixent est disponible sous les formes posologiques suivantes :

Dupixent est offert sous forme de seringue préremplie à usage unique (1 fois) munie d'un protecteur d'aiguille, ou sous forme de stylo injecteur prérempli. Votre professionnel de la santé vous prescrira le type qui vous convient le mieux.

Ne prenez pas Dupixent si :

Ne prenez pas Dupixent si vous êtes allergique au dupilumab ou à l'un des ingrédients de Dupixent.

Dupixent est susceptible d'entraîner des effets secondaires graves, notamment des réactions allergiques généralisées (hypersensibilité) et une réaction anaphylactique. Vérifiez l'apparition de signes ou de symptômes des affections suivantes (difficulté à respirer, enflure du visage, des lèvres, de la bouche, de la gorge ou de la langue, évanouissements, étourdissements, sensation de tête légère [tension artérielle basse], fièvre, sensation de malaise, ganglions lymphatiques enflés, urticaire, démangeaisons, douleurs articulaires, éruption cutanée) pendant que vous prenez Dupixent. Arrêtez de prendre Dupixent et dites-le à votre professionnel de la santé ou obtenez des soins médicaux immédiatement si vous présentez des signes ou symptômes d'une réaction allergique (voir aussi le tableau « Effets secondaires graves et mesures à prendre » ci-dessous).

Consultez votre professionnel de la santé avant de prendre Dupixent, afin de réduire la possibilité d'effets indésirables et pour assurer la bonne utilisation du médicament. Mentionnez à votre professionnel de la santé tous vos problèmes de santé, notamment :

- si vous avez une infection parasitaire (parasites intestinaux); Dupixent peut affaiblir votre résistance aux infections causées par des parasites. si vous souffrez déjà d'une infection parasitaire, celle-ci doit être traitée avant le début de votre traitement par Dupixent; si vous résidez dans une région où ces infections sont fréquentes ou si vous voyagez dans une de ces régions, veuillez consulter votre médecin;
- si vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir; On ne sait pas si Dupixent peut être nocif pour un enfant à naître. Dites à votre professionnel de la santé si vous devenez enceinte pendant la prise de Dupixent.
- si vous allaitez ou prévoyez allaiter; Vous et votre professionnel de la santé devrez décider si vous prendrez Dupixent ou si vous allaiterez. Vous ne devriez pas faire les deux sans d'abord parler à votre professionnel de la santé.
- si vous êtes atteint d'autres troubles allergiques, comme l'asthme, et prenez des médicaments contre l'asthme;
- si vous prévoyez recevoir un vaccin;
- si vous avez des problèmes au niveau des yeux (p. ex. démangeaisons, rougeur).

Autres mises en garde à connaître :

Dupixent n'est pas un médicament de secours et ne doit pas être utilisé pour traiter une crise d'asthme soudaine.

N'arrêtez pas de prendre et ne réduisez pas la dose de vos médicaments contre l'asthme, à moins

d'indication contraire de votre professionnel de la santé. Ces médicaments (en particulier ceux appelés *corticostéroïdes*) doivent être arrêtés progressivement, sous la supervision directe de votre professionnel de la santé. En de rares occasions, les patients qui prennent Dupixent pourraient voir apparaître une inflammation des vaisseaux sanguins ou des poumons en raison d'une augmentation du nombre de certains globules blancs (éosinophilie).

Ce trouble survient habituellement, mais pas toujours, chez des personnes qui prennent également un corticostéroïde et qui arrêtent de le prendre ou qui sont en train d'en diminuer la dose. Prévenez immédiatement votre professionnel de la santé si vous voyez apparaître une combinaison de symptômes comme les suivants : fièvre persistante, essoufflement, douleur à la poitrine, éruption cutanée et/ou picotements ou engourdissement dans les bras ou les jambes.

Il n'existe aucune expérience avec Dupixent chez les enfants âgés de moins de 6 mois atteints de dermatite atopique. Par conséquent, l'utilisation de Dupixent n'est pas recommandée dans ce groupe d'âge.

Mentionnez à votre professionnel de la santé toute la médication que vous prenez, y compris les médicaments, les vitamines, les minéraux, les suppléments naturels ou les produits les médicaments alternatifs.

Les produits qui suivent pourraient être associés à des interactions médicamenteuses avec Dupixent :

Informez votre professionnel de la santé que vous prenez Dupixent si vous avez récemment reçu un vaccin ou si vous êtes sur le point de recevoir un vaccin. Dupixent ne doit pas être utilisé en même temps que certains types de vaccins.

Comment prendre Dupixent :

Vérifiez toujours l'étiquette de votre seringue ou de votre stylo injecteur préremplis avant chaque injection pour vous assurer que vous avez le bon produit.

On doit permettre à Dupixent d'atteindre la température ambiante en attendant 45 minutes (pour une seringue ou un stylo injecteur préremplis de 300 mg) et 30 minutes (pour une seringue ou un stylo injecteur préremplis de 200 mg) après l'avoir retiré du réfrigérateur avant l'injection.

Le stylo injecteur prérempli Dupixent n'est pas destiné à être utilisé chez les enfants de moins de 2 ans. Pour les enfants âgés de 6 mois à 2 ans, communiquez avec votre médecin qui vous prescrira la seringue préremplie munie d'un protecteur d'aiguille Dupixent appropriée.

Chez les enfants âgés de 6 mois à moins de 12 ans, Dupixent doit être administré par un aidant.

Chez les adolescents de 12 ans et plus, il est recommandé que Dupixent soit administré par un adulte ou sous sa supervision.

Dupixent est injecté sous la peau (utilisation sous-cutanée) du haut des jambes (cuisses) ou du ventre (abdomen, sauf les 5 cm autour de votre nombril); si quelqu'un d'autre vous donne l'injection, vous pouvez aussi utiliser le haut des bras. Choisissez un site différent à chaque injection (p. ex., cuisse droite puis cuisse gauche, ou côté droit puis côté gauche de l'abdomen). N'injectez pas le médicament là où la peau est sensible ou blessée, ni en présence d'un bleu ou d'une cicatrice.

N'injectez pas Dupixent et d'autres médicaments injectables au même site d'injection.

Il est important de ne pas cesser d'utiliser Dupixent sans en parler à votre professionnel de la santé. Avant d'arrêter le traitement par Dupixent, consultez votre professionnel de la santé si vous devez ajuster votre traitement ou si vous devez prendre en charge d'autres affections allergiques ou atopiques.

N'utilisez pas Dupixent pour une affection pour laquelle il n'a pas été prescrit. Ne donnez pas Dupixent à d'autres personnes, même si elles présentent les mêmes signes ou symptômes que vous; cela pourrait leur être néfaste.

Apprendre à utiliser la seringue préremplie avec protecteur d'aiguille ou le stylo injecteur prérempli

- Avant d'utiliser pour la première fois la seringue ou le stylo injecteur préremplis, votre professionnel de la santé vous montrera, à vous ou à votre aidant, comment injecter Dupixent. N'essayez pas d'injecter Dupixent si votre professionnel de la santé ne vous a pas montré, à vous ou à votre aidant, comment le faire correctement.
- Lisez et utilisez toujours la seringue ou le stylo injecteur préremplis comme décrit dans le « Mode d'emploi » fourni dans la boîte.

Dose habituelle :

Utilisez Dupixent exactement comme votre professionnel de la santé l'a prescrit.

Dermatite atopique

Dose recommandée chez les adultes

Dans le cas de la dermatite atopique, la première fois que vous utiliserez Dupixent, vous recevrez 600 mg (deux (2) injections sous-cutanées de 300 mg chacune dans deux points d'injection différents). Dupixent est administré par injection sous-cutanée de 300 mg une fois toutes les deux semaines.

Dose recommandée pour les enfants (âgés de 6 à 17 ans)

La dose recommandée de Dupixent pour les enfants (âgés de 6 à 17 ans) atteints de dermatite atopique est basée sur le poids corporel :

Poids corporel	Dose initiale	Doses suivantes
15 kg à moins de 30 kg	600 mg (deux injections de 300 mg)	300 mg toutes les quatre semaines (T4S)
30 kg à moins de 60 kg	400 mg (deux injections de 200 mg)	200 mg toutes les deux semaines (T2S)
60 kg ou plus	600 mg (deux injections de 300 mg)	300 mg toutes les deux semaines (T2S)

Enfants (âgés de 6 mois à 5 ans)

La dose recommandée de Dupixent pour les enfants âgés de 6 mois à 5 ans est indiquée dans le tableau ci-dessous.

Tableau : Dose de Dupixent pour administration sous-cutanée chez des patients pédiatriques âgés de 6 mois à 5 ans atteints de dermatite atopique

Poids corporel	Dose initiale	Doses suivantes
5 kg à moins de 15 kg	200 mg (une injection de 200 mg)	200 mg toutes les quatre semaines (T4S)
15 kg à moins de 30 kg	300 mg (une injection de 300 mg)	300 mg toutes les quatre semaines (T4S)

Asthme

Pour les cas d'asthme éosinophilique sévère, la dose recommandée de Dupixent pour les adultes et les adolescents (12 ans et plus) est :

- Une première dose de 400 mg (deux (2) injections sous la peau de 200 mg) suivie de 200 mg toutes les deux semaines par injection. La dose peut être augmentée à 300 mg toutes les deux semaines, selon l'évaluation de votre professionnel de la santé.

Pour les cas d'asthme sévère nécessitant des corticostéroïdes oraux, la dose de Dupixent pour les adultes et les adolescents (12 ans et plus) est :

- Une première dose de 600 mg (deux (2) injections sous la peau de 300 mg) suivie de 300 mg toutes les deux semaines par injection.

La dose recommandée de Dupixent pour les enfants de 6 à 11 ans est basée sur le poids corporel :

Poids corporel	Doses initiales et suivantes
15 kg à moins de 30 kg	300 mg toutes les quatre semaines (T4S)
30 kg à moins de 60 kg	200 mg toutes les deux semaines (T2S) ou 300 mg toutes les quatre semaines (T4S)
60 kg ou plus	200 mg toutes les deux semaines (T2S)

RSC-PN

Pour les cas de RCS-PN, Dupixent est administré par injection sous-cutanée de 300 mg une fois toutes les deux semaines.

Œsophagite à éosinophiles

La dose de Dupixent recommandée chez les enfants âgés d'un an et plus, pesant au moins 15 kg, est indiquée dans le tableau ci-dessous.

Dose de Dupixent à administrer par voie sous-cutanée chez les enfants âgés d'un an et plus, pesant au moins 15 kg, atteints d'œsophagite à éosinophiles

Poids corporel	Doses
15 kg à moins de 30 kg	200 mg toutes les deux semaines (T2S)
30 kg à moins de 40 kg	300 mg toutes les deux semaines (T2S)
40 kg ou plus	300 mg chaque semaine (TS)

Prurigo nodulaire

La posologie de DUPIXENT recommandée chez les patients adultes est constituée d'une dose initiale de 600 mg (deux injections de 300 mg), suivie d'une dose de 300 mg toutes les deux semaines.

Surdosage :

Si vous pensez que vous ou une personne dont vous vous occupez avez pris trop de Dupixent, contactez immédiatement un professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou votre centre antipoison régional, même en l'absence de symptômes.

Dose oubliée :

- **Si vous prenez Dupixent toutes les semaines et que vous oubliez une dose**, faites l'injection dès que possible et recommencez un nouveau calendrier d'administration à partir de cette date.
- **Si une dose de Dupixent administrée toutes les deux semaines est oubliée** : faites l'injection dans les 7 jours qui suivent la dose oubliée et poursuivez le traitement selon le calendrier habituel. Si la dose oubliée n'est pas administrée dans les sept jours, attendez le moment de la prochaine dose prévue pour administrer votre injection de Dupixent.
- **Si une dose de Dupixent administrée toutes les quatre semaines est oubliée** : faites l'injection dans les 7 jours qui suivent la dose oubliée et poursuivez le traitement selon le calendrier habituel. Si la dose oubliée n'est pas administrée dans les 7 jours, commencez un nouveau schéma posologique toutes les 4 semaines à partir du moment auquel vous vous souvenez de prendre votre injection de Dupixent.

Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à Dupixent?

Dupixent peut causer des **réactions allergiques (hypersensibilité)**, y compris une réaction grave appelée anaphylaxie. Arrêtez d'utiliser Dupixent et dites-le à votre professionnel de la santé ou demandez des soins médicaux d'urgence si vous remarquez des signes ou des symptômes d'une réaction allergique, notamment :

- difficulté à respirer
- enflure du visage, des lèvres, de la bouche, de la gorge ou de la langue (œdème de Quincke)
- fièvre
- sensation d'être malade
- ganglions lymphatiques enflés
- urticaire
- démangeaisons
- éruption cutanée
- démangeaisons de la peau ou des paupières
- douleurs articulaires
- évanouissement, étourdissements, sensation de tête légère (tension artérielle basse)

Dupixent peut causer des **problèmes aux yeux**, notamment de la douleur ou un changement de la vision. Avisez votre professionnel de la santé si vous avez de nouveaux problèmes aux yeux ou des problèmes aux yeux qui s'aggravent pendant le traitement par Dupixent.

En prenant Dupixent, vous pourriez présenter d'autres effets secondaires que ceux qui figurent sur cette liste. Si c'est le cas, communiquez avec votre professionnel de la santé. Veuillez également consulter la section « N'utilisez pas Dupixent si » ci-dessus.

Les effets secondaires les plus fréquents de Dupixent comprennent :

- réactions au site d'injection
- inflammation des yeux et des paupières, y compris rougeur, enflure, démangeaisons ou sécheresse oculaire, parfois avec vision floue
- infections oculaires
- feux sauvages dans la bouche ou sur les lèvres (herpès buccal)
- nombre extrêmement élevé d'un certain type de globules blancs (éosinophilie)
- difficulté à dormir (insomnie)
- gastrite
- douleurs aux articulations (arthralgie)
- céphalées
- éruption cutanée ou rougeur au visage
- infection parasitaire causée par des helminthes

Effets secondaires graves et mesures à prendre			
Symptôme / effet	Consultez avec votre professionnel de la santé		Cessez de prendre des médicaments et obtenez de l'aide médicale immédiatement
	Seulement si l'effet est grave	Dans tous les cas	
PEU COURANTS			
Réactions allergiques (hypersensibilité)			✓

En cas de symptôme ou d'effet secondaire gênant non mentionné dans le présent document ou d'aggravation d'un symptôme ou d'effet secondaire vous empêchant de vaquer à vos occupations quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé.

Déclaration des effets secondaires

Vous pouvez déclarer des effets secondaires soupçonnés d'être associés à l'utilisation d'un produit à Santé Canada en :

- Visitant le site Web des déclarations des effets indésirables (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html>) pour vous informer sur comment faire une déclaration en ligne, par courriel, ou par télécopieur; ou
- Téléphonant sans frais au 1-866-234-2345.

REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous avez besoin de renseignements sur le traitement des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.

Entreposage :

Garder hors de la portée et de la vue des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'étiquette et la boîte.

Conservez au réfrigérateur (2 à 8 °C). Ne pas congeler.

Conservez la seringue ou le stylo injecteur dans sa boîte externe afin de la/le garder à l'abri de la lumière.

Ne les exposez pas à une chaleur extrême.

On doit permettre à Dupixent d'atteindre la température ambiante en attendant 45 minutes (pour une seringue ou un stylo injecteur préremplis de 300 mg) ou 30 minutes (pour une seringue ou un stylo injecteur préremplis de 200 mg) après l'avoir retiré du réfrigérateur avant l'injection.

Si nécessaire, les seringues ou stylos injecteurs préremplis peuvent être conservés à une température ambiante ne dépassant pas 25 °C, à l'abri de toute source de chaleur ou de lumière directe, pendant un maximum de 14 jours. Ne les conservez pas à plus de 25 °C. Dupixent doit être utilisé dans les 14 jours suivant sa sortie du réfrigérateur ou être jeté.

N'utilisez pas ce médicament si la solution est trouble, a changé de couleur ou s'il contient des flocons ou des particules visibles.

Le stylo injecteur prérempli peut avoir un capuchon rond et une fenêtre de visualisation ovale encerclée avec une flèche ou peut avoir un capuchon carré avec des stries et une fenêtre de visualisation ovale sans flèche. Bien qu'il y ait des différences mineures dans l'apparence des deux stylos injecteurs préremplis, ils fonctionnent tous les deux de la même façon.

Après utilisation, placez la seringue ou le stylo injecteur dans un contenant résistant à la perforation. Gardez toujours le contenant hors de la portée des enfants. Demandez à votre professionnel de la santé ou à votre pharmacien comment jeter le contenant. Ne recyclez pas le contenant.

Ne jetez aucun médicament dans l'évier, la toilette ou les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien comment jeter les médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures contribuent à la protection de l'environnement.

Pour en savoir davantage au sujet de Dupixent :

- Communiquer avec votre professionnel de la santé
- Lire la monographie de produit intégrale rédigée à l'intention des professionnels de la santé, qui renferme également les renseignements sur le médicament pour le patient. Ce document est disponible sur le site Web de Santé Canada : (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html>); le site Web du fabricant www.sanofi.ca ou peut être obtenu en téléphonant au 1-800-265-7927.

Le présent dépliant a été rédigé par sanofi-aventis Canada Inc.

Dupixent[®] est une marque de commerce de Sanofi Biotechnology.

Dernière révision : 18 novembre 2024

MODE D'EMPLOI


SERINGUE PRÉREMPLIE DUPIXENT À USAGE UNIQUE DE 300 mg AVEC PROTECTEUR D'AIGUILLE

Lisez le « Mode d'emploi » avant d'utiliser la seringue préremplie de Dupixent avec protecteur d'aiguille. N'injectez pas à vous-même ou à quelqu'un d'autre avant d'avoir été formé par un professionnel de la santé sur la façon de préparer une dose et d'injecter Dupixent. Chez les adolescents âgés de 12 ans et plus, on recommande que Dupixent soit administré par un adulte ou sous sa surveillance. Chez les enfants de moins de 12 ans, Dupixent doit être administré par un aidant.

Ce dispositif est une seringue préremplie à **usage unique** (appelée « seringue » dans ces instructions) avec un protecteur d'aiguille. Il contient 300 mg de Dupixent pour injection sous la peau (injection sous-cutanée).

Conservez ces instructions pour une utilisation future. Si vous avez d'autres questions, vous devez les poser à votre professionnel de la santé ou composer le 1-800-265-7927.

Les parties de la seringue de Dupixent sont illustrées dans cette image.



Renseignements importants

- Il est important de ne pas essayer d'administrer l'injection à vous-même ou à quelqu'un d'autre, à moins d'avoir reçu une formation de votre professionnel de la santé.
- Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser la seringue.
- Demandez à votre professionnel de la santé à quelle fréquence vous devrez injecter le médicament.
- Demandez à votre professionnel de la santé de vous montrer la bonne façon d'utiliser la seringue avant de faire l'injection pour la première fois.
- Changez le site d'injection à chaque utilisation.
- Pour réduire le risque de piqûres d'aiguille accidentelles, chaque seringue préremplie est munie d'un protecteur d'aiguille qui est automatiquement activé pour couvrir l'aiguille après l'injection
- **N'utilisez pas** la seringue si elle est tombée sur une surface dure ou si elle a été endommagée.
- **N'utilisez pas** la seringue si le capuchon d'aiguille est manquant ou s'il est mal fixé.
- **Ne touchez pas** à la tige du piston avant d'être prêt à administrer l'injection.
- **N'injectez pas** le médicament à travers les vêtements.
- **Ne tentez pas** d'éliminer des bulles d'air de la seringue.
- **Ne tirez jamais** sur la tige du piston.
- **Ne réutilisez pas** la seringue.

Comment conserver Dupixent :

- Gardez la ou les seringues hors de la portée des enfants.
- Conservez les seringues inutilisées dans leur emballage d'origine et conservez-les au réfrigérateur entre 2 °C et 8 °C.
- Sortez la seringue du réfrigérateur au moins 45 minutes avant l'injection afin qu'elle atteigne la température ambiante.
- **Ne gardez pas** Dupixent à la température ambiante pendant plus de 14 jours.
- **N'agitez jamais** la seringue.
- **Ne faites pas chauffer** la seringue.
- **Ne congelez pas** la seringue.
- **Ne placez pas** la seringue sous la lumière directe du soleil.

Comment éliminer (jeter) les seringues usagées

Placez vos aiguilles et seringues usagées dans un contenant-résistant à la perforation immédiatement après usage.



Ne jetez pas les seringues dans vos ordures ménagères.

Si vous ne disposez pas d'un contenant résistant à la perforation, vous pouvez utiliser un contenant ménager qui :

- est fait de plastique robuste;
- est muni d'un couvercle étanche et résistant à la perforation qui empêche les objets piquants ou tranchants de sortir;
- reste droit et stable pendant l'utilisation;
- résiste aux fuites; et
- est correctement étiqueté pour indiquer que des déchets dangereux s'y trouvent.

Lorsque votre contenant résistant à la perforation est presque plein, vous devez suivre vos règlements provinciaux ou locaux pour en disposer de la bonne façon.

Étape 1 : Retirer

Retirez la seringue de la boîte en la tenant par le milieu :




Ne retirez pas le capuchon de l'aiguille avant d'être prêt à faire l'injection.



N'utilisez pas la seringue si elle est tombée sur une surface dure ou si elle a été endommagée.



Ne gardez pas Dupixent à la température ambiante pendant plus de 14 jours.



Étape 2 : Préparer

Assurez-vous d'avoir ce qui suit :

- la seringue préremplie de Dupixent avec protecteur d'aiguille
- une lingette imbibée d'alcool*
- un tampon d'ouate ou de la gaze*
- un contenant résistant à la perforation* (voir l'étape 12)


* *Articles non inclus dans la boîte*

Inspectez l'étiquette :

- Vérifiez la date de péremption
- Vérifiez que vous avez le bon produit et la bonne dose



N'utilisez pas la seringue si la date de péremption est dépassée.



Étape 3 : Inspecter


Regardez le médicament à travers la fenêtre de visualisation sur la seringue :

Assurez-vous que le liquide est limpide et incolore ou jaune pâle.

Remarque : Il serait normal d'observer une bulle d'air.




N'utilisez pas la seringue si le liquide est trouble, a changé de couleur ou contient des flocons ou des particules visibles.



Étape 4 : Attendez 45 minutes

Déposez la seringue sur une surface plane et laissez-la se réchauffer naturellement à la température ambiante pendant au moins 45 minutes.

-  **Ne faites pas chauffer** la seringue.
-  **Ne placez pas** la seringue sous la lumière directe du soleil.
-  **Ne gardez pas** Dupixent à la température ambiante pendant plus de 14 jours.




Étape 5 : Sélectionner

Choisissez le site d'injection.

- Vous pouvez injecter le médicament dans votre cuisse ou votre estomac, sauf à l'intérieur d'un rayon de 5 cm (2 pouces) autour de votre nombril (ombilic)
- Si quelqu'un d'autre procède à l'injection, le haut du bras peut aussi être utilisé.
- Changez le site d'injection pour chaque injection.

-  **N'injectez pas le médicament** là où la peau est sensible ou blessée, ni en présence d'un bleu ou d'une cicatrice.



-  = auto-injection ou injection par un aidant
-  = injection par un aidant seulement

Étape 6 : Nettoyer

Lavez vos mains.

Nettoyez le site d'injection avec un tampon imbibé d'alcool.

Laissez sécher votre peau avant de faire l'injection.



Ne retouchez pas au point d'injection et ne soufflez pas dessus avant l'injection.




Étape 7 : Tirer

Tenez la seringue par le milieu en orientant l'aiguille à l'opposé de votre corps et retirez le capuchon de la seringue.


-  **Ne remettez pas le capuchon d'aiguille en place.**
-  **Ne touchez pas à l'aiguille.**
-  **Ne procédez pas à l'injection si l'aiguille est endommagée**

Injectez votre médicament immédiatement après avoir retiré le capuchon de l'aiguille.




Étape 8 : Pincer

Pincez un pli de peau au niveau du site d'injection, comme illustré dans l'image.



Étape 9 : Insérer

Insérez la totalité de l'aiguille dans le pli de peau à un angle d'environ 45 °.



Étape 10 : Pousser

Relâchez la pincée de peau.

Enfoncez la tige du piston lentement d'un mouvement continu aussi loin que possible jusqu'à ce que la seringue soit vide.

Remarque : Vous sentirez une certaine résistance. Cela est normal.




Étape 11 : Relâcher et retirer

Levez votre pouce pour relâcher la tige du piston jusqu'à ce que l'aiguille soit recouverte par le protecteur d'aiguille, puis retirez la seringue du site d'injection.

Si du sang apparaît, appuyez légèrement sur le site d'injection à l'aide d'un tampon d'ouate ou d'une gaze.

 **Ne remettez pas le capuchon d'aiguille en place.**

 **Ne frottez pas la peau après l'injection**



Étape 12 : Jeter

Jetez la seringue et le capuchon de l'aiguille dans un contenant résistant à la perforation.

 **Ne remettez pas le capuchon d'aiguille en place.**

Gardez toujours le contenant hors de la portée des enfants.

Voir « Comment éliminer (jeter) les seringues usagées ».



MODE D'EMPLOI

SERINGUE PRÉREMPLIE DUPIXENT À USAGE UNIQUE DE 200 mg AVEC PROTECTEUR D'AIGUILLE


Lisez le mode d'emploi avant d'utiliser la seringue préremplie de Dupixent avec protecteur d'aiguille.

N'injectez pas à vous-même ou à quelqu'un d'autre avant d'avoir été formé par un professionnel de la santé sur la façon de préparer une dose et d'injecter Dupixent. Chez les adolescents âgés de 12 ans et plus, on recommande que Dupixent soit administré par un adulte ou sous sa surveillance. Chez les enfants de moins de 12 ans, Dupixent doit être administré par un aidant.

Ce dispositif est une seringue préremplie à **usage unique** (appelée « seringue » dans ces instructions) avec un protecteur d'aiguille. Il contient 200 mg de Dupixent pour injection sous la peau (injection sous-cutanée).

Conservez ces instructions pour une utilisation future. Si vous avez d'autres questions, vous devez les poser à votre professionnel de la santé ou composer le 1-800-265-7927.

Les parties de la seringue de Dupixent sont illustrées dans cette image.



Renseignements importants

- Il est important de ne pas essayer d'administrer l'injection à vous-même ou à quelqu'un d'autre, à moins d'avoir reçu une formation de votre professionnel de la santé.
- Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser la seringue.
- Demandez à votre professionnel de la santé à quelle fréquence vous devrez injecter le médicament.
- Demandez à votre professionnel de la santé de vous montrer la bonne façon d'utiliser la seringue avant de faire l'injection pour la première fois.
- Changez le site d'injection à chaque utilisation.
- Pour réduire le risque de piqûres d'aiguille accidentelles, chaque seringue préremplie est munie d'un protecteur d'aiguille qui est automatiquement activé pour couvrir l'aiguille après l'injection
- **N'utilisez pas** la seringue si elle a été endommagée.
- **N'utilisez pas** la seringue si le capuchon d'aiguille est manquant ou s'il est mal fixé.
- **Ne touchez pas** à la tige du piston avant d'être prêt à administrer l'injection.
- **N'injectez pas** le médicament à travers les vêtements.
- **Ne tentez pas** d'éliminer des bulles d'air de la seringue.
- **Ne tirez jamais** sur la tige du piston.
- **Ne réutilisez pas** la seringue.

Comment conserver Dupixent :

- Gardez la ou les seringues hors de la portée des enfants.
- Conservez les seringues inutilisées dans leur emballage d'origine et conservez-les au réfrigérateur entre 2 °C et 8 °C.
- Sortez la seringue du réfrigérateur au moins 30 minutes avant l'injection afin qu'elle atteigne la température ambiante.
- **Ne gardez pas** Dupixent à la température ambiante pendant plus de 14 jours.
- **N'agitez jamais** la seringue.
- **Ne faites pas chauffer** la seringue.
- **Ne congelez pas** la seringue.
- **Ne placez pas** la seringue sous la lumière directe du soleil.

Comment éliminer (jeter) les seringues usagées

Placez vos aiguilles et seringues usagées dans un contenant-résistant à la perforation immédiatement après usage.



Ne jetez pas les seringues dans vos ordures ménagères.

Si vous ne disposez pas d'un contenant résistant à la perforation, vous pouvez utiliser un contenant ménager qui :

- est fait de plastique robuste;
- est muni d'un couvercle étanche et résistant à la perforation qui empêche les objets piquants ou tranchants de sortir;
- reste droit et stable pendant l'utilisation;
- résiste aux fuites; et
- est correctement étiqueté pour indiquer que des déchets dangereux s'y trouvent.

Lorsque votre contenant résistant à la perforation est presque plein, vous devez suivre vos règlements provinciaux ou locaux pour en disposer de la bonne façon.

Étape 1 : Retirer

Retirez la seringue de la boîte en la tenant par le milieu :




Ne retirez pas le capuchon de l'aiguille avant d'être prêt à faire l'injection.



N'utilisez pas la seringue si elle est tombée sur une surface dure ou si elle a été endommagée.



Ne gardez pas Dupixent à la température ambiante pendant plus de 14 jours.



Étape 2 : Préparer

Assurez-vous d'avoir ce qui suit :

- la seringue préremplie de Dupixent avec protecteur d'aiguille
- une lingette imbibée d'alcool*
- un tampon d'ouate ou de la gaze*
- un contenant résistant à la perforation* (voir l'étape 12)


* *Articles non inclus dans la boîte*

Inspectez l'étiquette :

- Vérifiez la date de péremption
- Vérifiez que vous avez le bon produit et la bonne dose



N'utilisez pas la seringue si la date de péremption est dépassée.



Étape 3 : Inspecter


Regardez le médicament à travers la fenêtre de visualisation sur la seringue :

Assurez-vous que le liquide est limpide et incolore ou jaune pâle.

Remarque : Il serait normal d'observer une bulle d'air.



N'utilisez pas la seringue si le liquide est trouble, a changé de couleur ou contient des flocons ou des particules visibles.



Étape 4 : Attendre 30 minutes


Déposez la seringue sur une surface plane et laissez-la se réchauffer naturellement à la température ambiante pendant au moins 30 minutes.



Ne faites pas chauffer la seringue.

 **Ne placez pas** la seringue sous la lumière directe du soleil.

 **Ne gardez pas** Dupixent à la température ambiante pendant plus de 14 jours.




Étape 5 : Sélectionner

Choisissez le site d'injection.

- Vous pouvez injecter le médicament dans votre cuisse ou votre estomac, sauf à l'intérieur d'un rayon de 5 cm (2 pouces) autour de votre nombril (ombilic)
- Si quelqu'un d'autre procède à l'injection, le haut du bras peut aussi être utilisé.
- Changez le site d'injection pour chaque injection.

 **N'injectez pas le médicament là où la peau est sensible ou blessée, ni en présence d'un bleu ou d'une cicatrice.**



 = auto-injection ou injection par un aidant
 = injection par un aidant seulement

Étape 6 : Nettoyer

Lavez vos mains.

Nettoyez le site d'injection avec un tampon imbibé d'alcool.

Laissez sécher votre peau avant de faire l'injection.

⚠ Ne retouchez pas au point d'injection et ne soufflez pas dessus avant l'injection.



Étape 7 : Tirer


Tenez la seringue par le milieu en orientant l'aiguille à l'opposé de votre corps et retirez le capuchon de la seringue.

⚠ Ne remettez pas le capuchon d'aiguille en place.

⚠ Ne touchez pas à l'aiguille.


⚠ Ne procédez pas à l'injection si l'aiguille est endommagée

Injectez votre médicament immédiatement après avoir retiré le capuchon de l'aiguille.




Étape 8 : Pincer

Pincez un pli de peau au niveau du site d'injection, comme illustré dans l'image.



Étape 9 : Insérer

Insérez la totalité de l'aiguille dans le pli de peau à un angle d'environ 45 °.



Étape 10 : Pousser

Relâchez la pincée de peau.

Enfoncez la tige du piston lentement d'un mouvement continu aussi loin que possible jusqu'à ce que la seringue soit vide.

Remarque : Vous sentirez une certaine résistance. Cela est normal.



Étape 11 : Relâcher et retirer

Levez votre pouce pour relâcher la tige du piston jusqu'à ce que l'aiguille soit recouverte par le protecteur d'aiguille, puis retirez la seringue du site d'injection.

Si du sang apparaît, appuyez légèrement sur le site d'injection à l'aide d'un tampon d'ouate ou d'une gaze.

 **Ne remettez pas le capuchon d'aiguille en place.**

 **Ne frottez pas la peau après l'injection.**




Étape 12 : Jeter

Jetez la seringue et le capuchon de l'aiguille dans un contenant résistant à la perforation.

 **Ne remettez pas le capuchon d'aiguille en place.**

Gardez toujours le contenant hors de la portée des enfants.

Voir « Comment éliminer (jeter) les seringues usagées ».




MODE D'EMPLOI

STYLO INJECTEUR PRÉREMPLI DUPIXENT À USAGE UNIQUE de 300 mg

Lisez le « Mode d'emploi » avant d'utiliser le stylo injecteur prérempli Dupixent. N'injectez pas à vous-même ou à quelqu'un d'autre avant d'avoir été formé par un professionnel de la santé sur la façon de préparer une dose et d'injecter Dupixent. Le stylo injecteur prérempli Dupixent est destiné uniquement aux adultes et aux enfants âgés de 2 ans et plus. Chez les enfants de moins de 12 ans, Dupixent doit être administré par un aidant. Chez les adolescents de 12 ans et plus, il est recommandé que Dupixent soit administré par un adulte ou sous sa supervision.

Ce dispositif est un stylo injecteur prérempli à usage unique. Il contient 300 mg de Dupixent pour injection sous la peau (injection sous-cutanée).

Conservez ces instructions pour une utilisation future. Si vous avez d'autres questions, vous devriez les poser à votre professionnel de la santé ou composer le 1-800-265-7927.



Renseignements importants :

- Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le stylo injecteur prérempli.
- Demandez à votre professionnel de la santé à quelle fréquence vous devez injecter le médicament.
- Chez les adolescents de 12 ans et plus, il est recommandé que Dupixent soit administré par un adulte ou sous sa supervision.
- Chez les enfants âgés de 2 ans à moins de 12 ans, Dupixent doit être administré par un aidant.
- Choisissez un site d'injection différent pour chaque injection.
- **N'utilisez pas** le stylo injecteur prérempli s'il a été endommagé.
- **N'utilisez pas** le stylo injecteur prérempli si le capuchon vert est manquant ou s'il n'est pas bien fixé.
- **N'appuyez pas** sur le protecteur jaune de l'aiguille et n'y touchez pas avec les doigts.
- **N'injectez pas** le médicament à travers les vêtements.
- **Ne retirez pas** le capuchon vert avant d'être sur le point de faire l'injection.
- **Ne remettez pas** le capuchon vert sur le stylo injecteur prérempli.
- Éliminez (jetez) le stylo injecteur prérempli immédiatement après usage. Voir « Étape D : Jeter » ci-dessous.

Ne réutilisez pas un stylo injecteur prérempli.

Comment dois-je conserver Dupixent?

- Gardez le ou les stylos injecteurs préremplis et tous les médicaments hors de la portée et de la vue des enfants.
- Conservez les stylos injecteurs préremplis inutilisés au réfrigérateur entre 2 °C et 8 °C (36 °F et 46 °F).
- Conservez les stylos injecteurs préremplis dans leur emballage d'origine pour les protéger de la lumière.
- **Ne conservez pas** les stylos injecteurs préremplis à la température ambiante (moins de 25 °C (77 °F)) pendant plus de 14 jours. Éliminez (jetez) tous les stylos injecteurs préremplis laissés à la température ambiante pendant plus de 14 jours.
- **N'agitez pas** le stylo injecteur prérempli.
- **Ne faites pas chauffer** le stylo injecteur prérempli.
- **Ne congelez pas** le stylo injecteur prérempli.
- **N'exposez pas** le stylo injecteur prérempli à la lumière directe du soleil.


A : Préparer

A1. Rassembler les fournitures

Assurez-vous d'avoir ce qui suit :

- le stylo injecteur prérempli Dupixent
- une lingette imbibée d'alcool*
- un tampon d'ouate ou de la gaze*
- un contenant résistant à la perforation* (reportez-vous à l'étape D)

* Articles non inclus dans la boîte



A2. Inspecter l'étiquette

- Vérifiez que vous avez le bon produit et la bonne dose.

Inspecter l'étiquette



A3. Vérifier la date de péremption

- Vérifiez la date de péremption.

 **N'utilisez pas le stylo injecteur prérempli si la date de péremption est dépassée.**

Date de péremption



A4. Vérifier le médicament

Regardez le médicament à travers la fenêtre de visualisation du stylo injecteur prérempli :

Assurez-vous que le liquide est limpide et incolore ou jaune pâle.

Remarque : Il serait normal d'observer une bulle d'air.

⚠ N'utilisez pas le stylo injecteur prérempli si le liquide est décoloré ou trouble, ou s'il contient des flocons ou des particules visibles.

⚠ N'utilisez pas le stylo injecteur prérempli si la fenêtre de visualisation est jaune.

**Vérifier la
fenêtre**



A5 : Attendez 45 minutes

Déposez le stylo injecteur prérempli sur une surface plane et laissez-le se réchauffer à la température ambiante (inférieure à 25 °C [77 °F]) pendant au moins 45 minutes.

-  **Ne faites pas chauffer** le stylo injecteur prérempli.
-  **N'exposez pas** le stylo injecteur prérempli à la lumière directe du soleil.
-  **Ne gardez pas Dupixent à la température ambiante pendant plus de 14 jours. Éliminez (jetez) tous les stylos injecteurs Dupixent laissés à la température ambiante pendant plus de 14 jours.**



B. Choisir votre site d'injection

B1. Points d'injection recommandés :

- **Cuisse**
- **Abdomen**, sauf à 5 cm (2 pouces) autour de votre nombril (ombilic).
- **Partie supérieure du bras** Si un aidant vous administre votre dose, il peut également utiliser la partie extérieure du haut du bras.

Choisissez un site d'injection différent pour chaque injection de Dupixent. Si une deuxième injection est nécessaire pour obtenir la dose prescrite, espacez chaque site d'injection d'au moins 5 cm (2 pouces).

 **N'injectez pas** le médicament à travers les vêtements.


 **N'injectez pas** le médicament là où la peau est sensible ou blessée, ni en présence d'un bleu ou d'une cicatrice.

Injection par un aidant seulement

Auto-injection ou injection par un aidant

 Auto-injection ou injection par un aidant

 Injection par un aidant seulement




B2. Lavez vos mains



B3. Préparez le site d'injection

- Nettoyez le site d'injection avec un tampon imbibé d'alcool.
- Laissez sécher votre peau avant de faire l'injection.

⚠ Ne retouchez pas au point d'injection et ne soufflez pas dessus avant l'injection.



C. Administrer l'injection

C1. Retirez le capuchon vert


Retirez d'un seul coup le capuchon vert.

Ne dévissez pas le capuchon vert.

Ne retirez pas le capuchon vert avant d'être prêt à faire l'injection.

⚠ N'appuyez pas sur le protecteur jaune de l'aiguille et n'y touchez pas avec les doigts. L'aiguille se trouve à l'intérieur.

⚠ Ne remplacez pas le capuchon vert sur le stylo injecteur prérempli après l'avoir retiré.




C2. Pincer la peau et Placer

Pour les enfants âgés de 2 ans à moins de 12 ans, pincez la peau avant et pendant l'injection.

Il n'est pas nécessaire de pincer la peau chez les adultes et les adolescents âgés de 12 ans et plus.

- Lorsque vous placez le protecteur d'aiguille jaune sur votre peau, tenez le stylo injecteur prérempli de façon à voir sa fenêtre.
- Placez le protecteur d'aiguille jaune sur votre peau à un angle d'environ 90 °.

⚠ Ne touchez pas le protecteur d'aiguille jaune avec vos doigts. L'aiguille se trouve à l'intérieur.




C3. Appuyer

Appuyez le stylo injecteur prérempli contre votre peau et maintenez-le fermement en place jusqu'à ce que vous ne voyiez plus le protecteur d'aiguille jaune.

- Vous entendrez un « clic » lorsque l'injection commencera.
- Progressivement, la fenêtre deviendra jaune.

L'injection pourrait durer jusqu'à 20 secondes.

Il n'est pas nécessaire de pincer la peau chez les adultes et les adolescents âgés de 12 ans et plus.



C4. Tenir fermement


Continuez à tenir le stylo injecteur prérempli fermement contre votre peau.

- Vous pourriez entendre un second clic.
- Assurez-vous que toute la fenêtre est devenue jaune.
- Comptez lentement jusqu'à 5.
- Ensuite, soulevez le stylo de la peau, l'injection est terminée.

Si la fenêtre ne devient pas entièrement jaune, retirez le stylo injecteur et appelez votre professionnel de la santé.

⚠ Ne vous administrez pas une deuxième dose à moins d'indication contraire de votre professionnel de la santé.


Il n'est pas nécessaire de pincer la peau chez les adultes et les adolescents âgés de 12 ans et plus.



C5. Retirer

- Une fois l'injection terminée, retirez bien droit le stylo injecteur prérempli de votre peau.
- Si du sang apparaît, pressez doucement un tampon d'ouate ou de la gaze propres sur le site d'injection.

 **Ne frottez pas la peau après l'injection.**




D. Jeter

- Éliminez (jetez) les stylos injecteurs préremplis Dupixent usagés (dont l'aiguille est rétractée) et les capuchons verts dans un contenant résistant à la perforation immédiatement après usage.

Ne jetez pas les stylos injecteurs préremplis usagés (dont l'aiguille est rétractée) et les capuchons verts dans vos ordures ménagères.



Ne remettez pas le capuchon vert sur le stylo injecteur prérempli.




MODE D'EMPLOI

STYLO INJECTEUR PRÉREMPLI DUPIXENT À USAGE UNIQUE de 200 mg

Lisez le « Mode d'emploi » avant d'utiliser le stylo injecteur prérempli Dupixent. N'injectez pas à vous-même ou à quelqu'un d'autre avant d'avoir été formé par un professionnel de la santé sur la façon de préparer une dose et d'injecter Dupixent. Le stylo injecteur prérempli Dupixent est destiné uniquement aux adultes et aux enfants âgés de 2 ans et plus. Chez les enfants de moins de 12 ans, Dupixent doit être administré par un aidant. Chez les adolescents de 12 ans et plus, il est recommandé que Dupixent soit administré par un adulte ou sous sa supervision.

Ce dispositif est un stylo injecteur prérempli à usage unique. Il contient 200 mg de Dupixent pour injection sous la peau (injection sous-cutanée).

Conservez ces instructions pour une utilisation future. Si vous avez d'autres questions, vous devriez les poser à votre professionnel de la santé ou composer le 1-800-265-7927.



Renseignements importants

- Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le stylo injecteur prérempli.
- Demandez à votre professionnel de la santé à quelle fréquence vous devrez injecter le médicament.
- Chez les adolescents de 12 ans et plus, il est recommandé que Dupixent soit administré par un adulte ou sous sa supervision.
- Chez les enfants âgés de 2 ans à moins de 12 ans, Dupixent doit être administré par un aidant.
- Choisissez un site d'injection différent pour chaque injection.
- **N'utilisez pas** le stylo injecteur prérempli s'il a été endommagé.
- **N'utilisez pas** le stylo injecteur prérempli si le capuchon jaune est manquant ou n'est pas bien fixé.
- **N'appuyez pas** sur le protecteur orange de l'aiguille et n'y touchez pas avec les doigts.
- **N'injectez pas** le médicament à travers les vêtements.
- **NE retirez PAS** le capuchon jaune avant d'être sur le point de faire l'injection.
- **Ne remettez pas** le capuchon jaune sur le stylo injecteur prérempli.
- Éliminez (jetez) le stylo injecteur prérempli immédiatement après usage. Voir « Étape D : Jeter » ci-dessous.
- **Ne réutilisez pas** un stylo injecteur prérempli.

Comment dois-je conserver Dupixent?

- Gardez le ou les stylos injecteurs préremplis et tous les médicaments hors de la portée des enfants.
- Conservez les stylos injecteurs préremplis inutilisés au réfrigérateur entre 2 °C et 8 °C (36 °F et 46 °F).
- Conservez les stylos injecteurs préremplis dans leur emballage d'origine pour les protéger de la lumière.
- **Ne conservez pas** les stylos injecteurs préremplis à la température ambiante (moins de 77 °F ou moins de 25 °C) pendant plus de 14 jours. Éliminez (jetez) tous les stylos injecteurs préremplis laissés à la température ambiante pendant plus de 14 jours.
- **N'agitez jamais** le stylo injecteur prérempli.
- **Ne faites pas chauffer** le stylo injecteur prérempli.
- **Ne congelez pas** le stylo injecteur prérempli.
- **N'exposez pas** le stylo injecteur prérempli à la lumière directe du soleil.

A : Préparer

A1. Rassembler les fournitures

Assurez-vous d'avoir ce qui suit :

- le stylo injecteur prérempli Dupixent
- une lingette imbibée d'alcool*
- un tampon d'ouate ou de la gaze*
- un contenant résistant à la perforation* (reportez-vous à l'étape D)

* Articles non inclus dans la boîte



- le stylo injecteur DUPIXENT
- une lingette imbibée d'alcool*
- un tampon d'ouate ou de la gaze*
- un contenant pour objets pointus et tranchants* (reportez-vous à l'étape D)

* Articles non inclus dans la boîte.

A2. Inspecter l'étiquette

- Vérifiez que vous avez le bon produit et la bonne dose.

Inspecter l'étiquette



A3. Vérifier la date de péremption

- Vérifiez la date de péremption.

⚠ N'utilisez pas le stylo injecteur prérempli si la date de péremption est dépassée.

Date de péremption



A4. Vérifier le médicament


Regardez le médicament à travers la fenêtre de visualisation du stylo injecteur prérempli :

Assurez-vous que le liquide est limpide et incolore ou jaune pâle.

Remarque : Il serait normal d'observer une bulle d'air.

⚠ N'utilisez pas le stylo injecteur prérempli si le liquide est décoloré ou trouble, ou s'il contient des flocons ou des particules visibles.

⚠ N'utilisez pas le stylo injecteur prérempli si la fenêtre de visualisation est jaune.



A5 : Attendre 30 minutes

Déposez le stylo injecteur prérempli sur une surface plane et laissez-le se réchauffer naturellement à la température ambiante (inférieure à 25 °C [77 °F]) pendant au moins 30 minutes.

-  **Ne faites pas chauffer le stylo injecteur prérempli.**
-  **N'exposez pas le stylo injecteur prérempli à la lumière directe du soleil.**
-  **Ne gardez pas Dupixent à la température ambiante pendant plus de 14 jours. Éliminez (jetez) tous les stylos injecteurs Dupixent laissés à la température ambiante pendant plus de 14 jours.**



B. Choisir votre site d'injection


B1. Points d'injection recommandés :

- **Cuisse**
- **Abdomen**, sauf à 5 cm (2 po) autour de votre nombril (ombilic).
- **Partie supérieure du bras** Si un aidant vous administre votre dose, il peut également utiliser la partie extérieure du haut du bras.

Choisissez un site d'injection différent pour chaque injection de Dupixent.

⚠ N'injectez pas le médicament à travers les vêtements.

⚠ N'injectez pas le médicament là où la peau est sensible ou blessée, ni en présence d'un bleu ou d'une cicatrice.




B2. Lavez vos mains



B3. Préparez le site d'injection

- Nettoyez le site d'injection avec un tampon imbibé d'alcool.
- Laissez sécher votre peau avant de faire l'injection.

⚠ Ne retouchez pas au point d'injection et ne soufflez pas dessus avant l'injection.



C. Administrer l'injection


C1. Retirer le capuchon jaune

Ne dévissez pas le capuchon jaune.

Ne retirez pas le capuchon jaune avant d'être prêt à faire l'injection.

N'appuyez pas sur le protecteur orange de l'aiguille et n'y touchez pas avec les doigts. L'aiguille se trouve à l'intérieur.

⚠ Ne remplacez pas le capuchon jaune sur le stylo injecteur prérempli après l'avoir retiré.




C2. Pincer la peau et Placer

Pour les enfants âgés de 2 ans à moins de 12 ans, pincez la peau avant et pendant l'injection.

Il n'est pas nécessaire de pincer la peau chez les adultes et les adolescents âgés de 12 ans et plus.

- Lorsque vous placez le protecteur d'aiguille orange sur votre peau, tenez le stylo injecteur prérempli de façon à voir sa fenêtre.
- Placez le protecteur d'aiguille orange sur votre peau à un angle d'environ 90 °.

⚠ N'appuyez pas sur le protecteur orange de l'aiguille et n'y touchez pas avec les doigts. L'aiguille se trouve à l'intérieur.




C3. Appuyer

Appuyez le stylo injecteur prérempli contre votre peau et maintenez-le fermement en place jusqu'à ce que vous ne voyiez plus le protecteur d'aiguille orange.

- Vous entendrez un « clic » lorsque l'injection commencera.
- Progressivement, la fenêtre deviendra jaune.

L'injection pourrait durer jusqu'à 20 secondes.

Il n'est pas nécessaire de pincer la peau chez les adultes et les adolescents âgés de 12 ans et plus.



C4. Tenir fermement


Continuez à tenir le stylo injecteur prérempli fermement contre votre peau.

- Vous pourriez entendre un second clic.
- Assurez-vous que toute la fenêtre est devenue jaune.
- Comptez lentement jusqu'à 5.
- Retirez ensuite le stylo injecteur de la peau, votre injection est terminée.

Si la fenêtre ne devient pas entièrement jaune, retirez le stylo injecteur et appelez votre professionnel de la santé.

⚠ Ne vous administrez pas une deuxième dose à moins d'indication contraire de votre professionnel de la santé.


Il n'est pas nécessaire de pincer la peau chez les adultes et les adolescents âgés de 12 ans et plus.



C5. Retirer

- Une fois l'injection terminée, retirez bien droit le stylo injecteur prérempli de votre peau.
- Si du sang apparaît, pressez doucement un tampon d'ouate ou de la gaze propres sur le site d'injection.

 **Ne frottez pas la peau après l'injection.**




D. Jeter

- Éliminez (jetez) les stylos injecteurs préremplis Dupixent usagés (dont l'aiguille est rétractée) et les capuchons jaunes dans un contenant résistant à la perforation immédiatement après usage.

N'éliminez pas (ne jetez pas) les stylos injecteurs préremplis usagés (dont l'aiguille est rétractée) et les capuchons jaunes dans vos ordures ménagères.



Ne remettez pas le capuchon jaune en place.



DUPIXENT (dupilumab injectable) stylo injecteur prérempli de 200 mg


Mode d'emploi

Lisez le mode d'emploi avant d'utiliser le stylo injecteur prérempli DUPIXENT. N'injectez pas DUPIXENT à vous-même ou à quelqu'un d'autre avant qu'on vous ait montré comment le faire. Votre fournisseur de soins de santé peut vous montrer, à vous ou à votre aidant, comment préparer et injecter une dose de DUPIXENT avant que vous n'essayiez de le faire vous-même pour la première fois. Le stylo injecteur prérempli DUPIXENT est destiné uniquement aux adultes, aux adolescents et aux enfants âgés de 2 ans et plus. Chez les enfants de moins de 12 ans, Dupixent doit être administré par un aidant. Chez les adolescents de 12 ans et plus, il est recommandé que Dupixent soit administré par un adulte ou sous sa supervision.

Ce dispositif est un stylo injecteur prérempli à usage unique. Il contient 200 mg de DUPIXENT pour injection sous la peau (injection sous-cutanée).

Conservez ces instructions pour une utilisation future. Si vous avez d'autres questions, vous devriez les poser à votre professionnel de la santé ou composer le 1-800-265-7927.

Les parties du stylo injecteur prérempli DUPIXENT sont illustrées dans cette image.



Renseignements importants


- Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le stylo injecteur prérempli.
- Demandez à votre professionnel de la santé à quelle fréquence vous devrez injecter le médicament.
- Chez les adolescents de 12 ans et plus, il est recommandé que Dupixent soit administré par un adulte ou sous sa supervision
- Chez les enfants âgés de 2 ans à moins de 12 ans, Dupixent doit être administré par un aidant
- Choisissez un site d'injection différent pour chaque injection.
- N'utilisez pas le stylo injecteur prérempli s'il a été endommagé.
- **N'utilisez pas** le stylo injecteur prérempli si le capuchon jaune est manquant ou n'est pas bien fixé.
- **N'appuyez pas** sur le protecteur orange de l'aiguille et n'y touchez pas avec les doigts.
- **N'injectez pas** le médicament à travers les vêtements.
- **NE retirez PAS** le capuchon jaune avant d'être sur le point de faire l'injection.
- **Ne remettez pas** le capuchon jaune sur le stylo injecteur prérempli.
- Éliminez (jetez) le stylo injecteur prérempli immédiatement après usage. Voir « Étape D : Jeter » ci-dessous.
- **Ne réutilisez pas** un stylo injecteur prérempli.

Comment dois-je conserver DUPIXENT?

- Gardez le ou les stylos injecteurs préremplis et tous les médicaments hors de la portée des enfants.
- Conservez les stylos injecteurs préremplis inutilisés au réfrigérateur entre 2 °C et 8 °C (36 °F et 46 °F).
- Conservez les stylos injecteurs préremplis dans leur emballage d'origine pour les protéger de la lumière.
- **Ne conservez pas** les stylos injecteurs préremplis à la température ambiante (moins de 25 °C ou moins de 77 °F) pendant plus de 14 jours. Éliminez (jetez) tous les stylos injecteurs préremplis laissés à la température ambiante pendant plus de 14 jours.
- **N'agitez jamais** le stylo injecteur prérempli.
- **Ne faites pas chauffer** le stylo injecteur prérempli.
- **Ne congelez pas** le stylo injecteur prérempli.
- **N'exposez pas** le stylo injecteur prérempli à la lumière directe du soleil.

A : Préparer

A1. Rassembler les fournitures

<p>Assurez-vous d'avoir ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le stylo injecteur prérempli DUPIXENT • une lingette imbibée d'alcool* • un tampon d'ouate ou de la gaze* • un contenant résistant à la perforation* (reportez-vous à l'étape D) <p><i>* Articles non inclus dans la boîte</i></p>	 <ul style="list-style-type: none"> • le stylo injecteur DUPIXENT • une lingette imbibée d'alcool* • un tampon d'ouate ou de la gaze* • un contenant pour objets pointus et tranchants* <p><i>* Articles non inclus dans la boîte.</i></p>
<p>A2. Inspecter l'étiquette</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que vous avez le bon produit et la bonne dose. 	<p style="text-align: center;">Inspecter l'étiquette</p> 
<p>A3. Vérifier la date de péremption</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez la date de péremption. <p>⚠ N'utilisez pas le stylo injecteur prérempli si la date de péremption est dépassée.</p>	<p style="text-align: center;">Date de péremption</p> 
<p>A4. Vérifier le médicament</p>	

Regardez le médicament à travers la fenêtre de visualisation du stylo injecteur prérempli :

Assurez-vous que le liquide est limpide et incolore ou jaune pâle.

Remarque : Il serait normal d'observer une bulle d'air.

⚠ N'utilisez pas le stylo injecteur prérempli si le liquide est décoloré ou trouble, ou s'il contient des flocons ou des particules visibles.

⚠ N'utilisez pas le stylo injecteur prérempli si la fenêtre de visualisation est jaune.

Vérifier la
fenêtre



A5 : Attendre 30 minutes

Déposez le stylo injecteur prérempli sur une surface plane et laissez-le se réchauffer naturellement jusqu'à la température ambiante (moins de 25 °C ou moins de 77 °F) pendant au moins 30 minutes.

-  **Ne faites pas chauffer le stylo injecteur prérempli.**
-  **N'exposez pas le stylo injecteur prérempli à la lumière directe du soleil.**
-  **Ne gardez pas DUPIXENT à la température ambiante pendant plus de 14 jours. Éliminez (jetez) tous les stylos injecteurs DUPIXENT laissés à la température ambiante pendant plus de 14 jours.**



B. Choisir votre site d'injection


B1. Points d'injection recommandés :

- **Cuisse**
- **Abdomen**, sauf à 5 cm (2 po) autour de votre nombril (ombilic).
- **Partie supérieure du bras** Si un aidant vous administre votre dose, il peut également utiliser la partie extérieure du haut du bras.

Choisissez un site d'injection différent pour chaque injection de DUPIXENT.

 **N'injectez pas** le médicament à travers les vêtements.

 **N'injectez pas le médicament là où la peau est sensible ou blessée, ni en présence d'un bleu ou d'une cicatrice.**




B2. Lavez vos mains



B3. Préparez le site d'injection

- Nettoyez le site d'injection avec un tampon imbibé d'alcool.
- Laissez sécher votre peau avant de faire l'injection.

⚠ Ne retouchez pas au point d'injection et ne soufflez pas dessus avant l'injection.



C. Administrer l'injection


C1. Retirer le capuchon jaune

Ne dévissez pas le capuchon jaune.

Ne retirez pas le capuchon jaune avant d'être prêt à faire l'injection.

N'appuyez pas sur le protecteur orange de l'aiguille et n'y touchez pas avec les doigts. L'aiguille se trouve à l'intérieur.

⚠ Ne remplacez pas le capuchon jaune sur le stylo injecteur prérempli après l'avoir retiré.



C2. Pincer la peau et Placer


Pour les enfants âgés de 2 ans à moins de 12 ans, pincez la peau avant et pendant l'injection.

Il n'est pas nécessaire de pincer la peau chez les adultes et les adolescents âgés de 12 ans et plus

- Lorsque vous placez le protecteur d'aiguille orange sur votre peau, tenez le stylo injecteur prérempli de façon à voir sa fenêtre.
- Placez le protecteur d'aiguille orange sur votre peau à un angle d'environ 90 °.



N'appuyez pas sur le protecteur orange de l'aiguille et n'y touchez pas avec les doigts. L'aiguille se trouve à l'intérieur.




C3. Appuyer

Appuyez le stylo injecteur prérempli contre votre peau et maintenez-le fermement en place jusqu'à ce que vous ne voyiez plus le protecteur d'aiguille orange.

- Vous entendrez un « clic » lorsque l'injection commencera.
- Progressivement, la fenêtre deviendra jaune.

L'injection pourrait durer jusqu'à 15 secondes.

Il n'est pas nécessaire de pincer la peau chez les adultes et les adolescents âgés de 12 ans et plus.



C4. Tenir fermement


Continuez à tenir le stylo injecteur prérempli fermement contre votre peau.

- Vous pourriez entendre un second clic.
- Assurez-vous que toute la fenêtre est devenue jaune.
- Comptez lentement jusqu'à 5.
- Retirez ensuite le stylo injecteur de la peau, votre injection est terminée.

Si la fenêtre ne devient pas entièrement jaune, retirez le stylo injecteur et appelez votre professionnel de la santé.

⚠ Ne vous administrez pas une deuxième dose à moins d'indication contraire de votre professionnel de la santé.


Il n'est pas nécessaire de pincer la peau chez les adultes et les adolescents âgés de 12 ans et plus.



C5. Retirer

- Une fois l'injection terminée, retirez bien droit le stylo injecteur prérempli de votre peau.
- Si du sang apparaît, pressez doucement un tampon d'ouate ou de la gaze propres sur le site d'injection.

 **Ne frottez pas la peau après l'injection.**




D. Jeter

- Éliminez (jetez) les stylos injecteurs préremplis DUPIXENT usagés (dont l'aiguille est rétractée) et les capuchons jaunes dans un contenant résistant à la perforation immédiatement après usage.

N'éliminez pas (ne jetez pas) les stylos injecteurs préremplis usagés (dont l'aiguille est rétractée) et les capuchons jaunes dans vos ordures ménagères.



Ne remettez pas le capuchon jaune en place.



DUPIXENT (dupilumab injectable) stylo injecteur prérempli de 300 mg


Mode d'emploi

Lisez le mode d'emploi avant d'utiliser le stylo injecteur prérempli DUPIXENT. N'injectez pas DUPIXENT à vous-même ou à quelqu'un d'autre avant qu'on vous ait montré comment le faire. Votre fournisseur de soins de santé peut vous montrer, à vous ou à votre aidant, comment préparer et injecter une dose de DUPIXENT avant que vous n'essayiez de le faire vous-même pour la première fois. Le stylo injecteur prérempli DUPIXENT est destiné uniquement aux adultes et aux enfants âgés de 2 ans et plus. Chez les enfants de moins de 12 ans, Dupixent doit être administré par un aidant. Chez les adolescents âgés de 12 ans et plus, il est recommandé que DUPIXENT soit administré par un adulte ou sous sa surveillance.

Ce dispositif est un stylo injecteur prérempli à usage unique. Il contient 300 mg de DUPIXENT pour injection sous la peau (injection sous-cutanée).

Conservez ces instructions pour une utilisation future. Si vous avez d'autres questions, vous devriez les poser à votre professionnel de la santé ou composer le 1-800-265-7927.

Les parties du stylo injecteur prérempli DUPIXENT sont illustrées dans cette image.



Renseignements importants


- Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le stylo injecteur prérempli.
- Demandez à votre professionnel de la santé à quelle fréquence vous devrez injecter le médicament.
- Chez les adolescents de 12 ans et plus, il est recommandé que Dupixent soit administré par un adulte ou sous sa supervision.
- Chez les enfants âgés de 2 ans à moins de 12 ans, Dupixent doit être administré par un aidant
- Choisissez un site d'injection différent pour chaque injection.
- **N'utilisez pas** le stylo injecteur prérempli s'il a été endommagé.
- **N'utilisez pas** le stylo injecteur prérempli si le capuchon vert est manquant ou s'il n'est pas bien fixé.
- **N'appuyez pas** sur le protecteur jaune de l'aiguille et n'y touchez pas avec les doigts.
- **N'injectez pas** le médicament à travers les vêtements.
- **Ne retirez pas** le capuchon vert avant d'être sur le point de faire l'injection.
- **Ne remettez pas** le capuchon vert sur le stylo injecteur prérempli.
- Éliminez (jetez) le stylo injecteur prérempli immédiatement après usage. Voir « Étape D : Jeter » ci-dessous.
- **Ne réutilisez pas** un stylo injecteur prérempli.

Comment dois-je conserver DUPIXENT?

- Gardez le ou les stylos injecteurs préremplis et tous les médicaments hors de la portée des enfants.
- Conservez les stylos injecteurs préremplis inutilisés au réfrigérateur entre 2 °C et 8 °C (36 °F et 46 °F).
- Conservez les stylos injecteurs préremplis dans leur emballage d'origine pour les protéger de la lumière.
- **Ne conservez pas** les stylos injecteurs préremplis à la température ambiante (moins de 25 °C ou moins de 77 °F) pendant plus de 14 jours. Éliminez (jetez) tous les stylos injecteurs préremplis laissés à la température ambiante pendant plus de 14 jours.
- **N'agitez jamais** le stylo injecteur prérempli.
- **Ne faites pas chauffer** le stylo injecteur prérempli.
- **Ne congelez pas** le stylo injecteur prérempli.
- **N'exposez pas** le stylo injecteur prérempli à la lumière directe du soleil.

A : Préparer

A1. Rassembler les fournitures

<p>Assurez-vous d'avoir ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le stylo injecteur prérempli DUPIXENT • une lingette imbibée d'alcool* • un tampon d'ouate ou de la gaze* • un contenant résistant à la perforation* (reportez-vous à l'étape D) <p><i>* Articles non inclus dans la boîte</i></p>	 <ul style="list-style-type: none"> • le stylo injecteur DUPIXENT • une lingette imbibée d'alcool* • un tampon d'ouate ou de la gaze* • un contenant pour objets pointus et tranchants* (reportez-vous à l'étape D) <p><i>* Articles non inclus dans la boîte.</i></p>
<p>A2. Inspecter l'étiquette</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que vous avez le bon produit et la bonne dose. 	<p style="text-align: center;">Inspecter l'étiquette</p> 
<p>A3. Vérifier la date de péremption</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez la date de péremption. <p>⚠ N'utilisez pas le stylo injecteur prérempli si la date de péremption est dépassée.</p>	<p style="text-align: center;">Date de péremption</p> 
<p>A4. Vérifier le médicament</p>	

Regardez le médicament à travers la fenêtre de visualisation du stylo injecteur prérempli :


Assurez-vous que le liquide est limpide et incolore ou jaune pâle.

Remarque : Il serait normal d'observer une bulle d'air.

⚠ N'utilisez pas le stylo injecteur prérempli si le liquide est décoloré ou trouble, ou s'il contient des flocons ou des particules visibles.

⚠ N'utilisez pas le stylo injecteur prérempli si la fenêtre de visualisation est jaune.

Vérifier la fenêtre



A5 : Attendez 45 minutes

Déposez le stylo injecteur prérempli sur une surface plane et laissez-le se réchauffer naturellement jusqu'à la température ambiante (moins de 25 °C ou moins de 77 °F) pendant au moins 45 minutes.

-  **Ne faites pas chauffer** le stylo injecteur prérempli.
-  **N'exposez pas** le stylo injecteur prérempli à la lumière directe du soleil.
-  **Ne gardez pas DUPIXENT à la température ambiante pendant plus de 14 jours. Éliminez (jetez) tous les stylos injecteurs DUPIXENT laissés à la température ambiante pendant plus de 14 jours.**



B. Choisir votre site d'injection


B1. Points d'injection recommandés :

- **Cuisse**
- **Abdomen**, sauf à 5 cm (2 pouces) autour de votre nombril.
- **Partie supérieure du bras**
Si un aidant vous administre votre dose, il peut également utiliser la partie extérieure du haut du bras.

Choisissez un site d'injection différent pour chaque injection de DUPIXENT.

 **N'injectez pas** le médicament à travers les vêtements.

 **N'injectez pas le médicament là où la peau est sensible ou blessée, ni en présence d'un bleu ou d'une cicatrice.**



Injection par un aidant seulement

Auto-injection ou injection par un aidant

 Auto-injection ou injection par un aidant

 Injection par un aidant seulement


B2. Lavez vos mains



B3. Préparez le site d'injection

- Nettoyez le site d'injection avec un tampon imbibé d'alcool.
- Laissez sécher votre peau avant de faire l'injection.

 **Ne retouchez pas au point d'injection et ne soufflez pas dessus avant l'injection.**



C. Administrer l'injection


C1. Retirez le capuchon vert

Ne dévissez pas le capuchon vert.

Ne retirez pas le capuchon vert avant d'être prêt à faire l'injection.

N'appuyez pas sur le protecteur jaune de l'aiguille et n'y touchez pas avec les doigts. L'aiguille se trouve à l'intérieur.

 **Ne remplacez pas le capuchon vert sur le stylo injecteur prérempli après l'avoir retiré.**



C2. Pincer la peau et Placer


Pour les enfants âgés de 2 ans à moins de 12 ans, pincez la peau avant et pendant l'injection.

Il n'est pas nécessaire de pincer la peau chez les adultes et les adolescents âgés de 12 ans et plus.

- Lorsque vous placez le protecteur d'aiguille jaune sur votre peau, tenez le stylo injecteur prérempli de façon à voir sa fenêtre.
- Placez le protecteur d'aiguille jaune sur votre peau à un angle d'environ 90 °.



N'appuyez pas sur le protecteur jaune de l'aiguille et n'y touchez pas avec les doigts. L'aiguille se trouve à l'intérieur.



Pincer la peau


C3. Appuyer

Appuyez le stylo injecteur prérempli contre votre peau et maintenez-le en place fermement jusqu'à ce que vous ne voyiez plus le protecteur d'aiguille jaune.

- Vous entendrez un « clic » lorsque l'injection commencera.
- Progressivement, la fenêtre deviendra jaune.

L'injection pourrait durer jusqu'à 15 secondes.

Il n'est pas nécessaire de pincer la peau chez les adultes et les adolescents âgés de 12 ans et plus.



C4. Tenir fermement


Continuez à tenir le stylo injecteur prérempli fermement contre votre peau.

- Vous pourriez entendre un second clic.
- Assurez-vous que toute la fenêtre est devenue jaune.
- Comptez lentement jusqu'à 5.
- Retirez ensuite le stylo injecteur de la peau, votre injection est terminée.

Si la fenêtre ne devient pas entièrement jaune, retirez le stylo injecteur et appelez votre professionnel de la santé.

 **Ne vous administrez pas une deuxième dose à moins d'indication contraire de votre professionnel de la santé.**


Il n'est pas nécessaire de pincer la peau chez les adultes et les adolescents âgés de 12 ans et plus



C5. Retirer

- Une fois l'injection terminée, retirez bien droit le stylo injecteur prérempli de votre peau.
- Si du sang apparaît, pressez doucement un tampon d'ouate ou de la gaze propres sur le site d'injection.

 **Ne frottez pas la peau après l'injection.**



D. Jeter

- Éliminez (jetez) les stylos injecteurs préremplis DUPIXENT usagés (dont l'aiguille est rétractée) et les capuchons verts dans un contenant résistant à la perforation immédiatement après usage.

N'éliminez pas (ne jetez pas) les stylos injecteurs préremplis usagés (dont l'aiguille est rétractée) et les capuchons verts dans vos ordures ménagères.



Ne remettez pas le capuchon vert en place.

