

RENSEIGNEMENTS SUR LE MÉDICAMENT POUR LE PATIENT

LISEZ CE DOCUMENT POUR ASSURER UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT

TYPHIM Vi®

Vaccin polysaccharidique capsulaire Vi contre *Salmonella typhi*

Lisez attentivement ce qui suit avant que vous ou votre enfant receviez TYPHIM Vi®. Les renseignements présentés ici sont un résumé et ne couvrent pas tout ce qui a trait à TYPHIM Vi®. Parlez à votre médecin, votre infirmière ou votre pharmacien si vous avez des questions à propos de ce vaccin.

Pourquoi TYPHIM Vi® est-il utilisé?

La fièvre typhoïde est une maladie infectieuse qui se propage par la consommation d'eau et d'aliments contaminés par la bactérie (*Salmonella typhi*) qui cause la maladie. Il s'agit d'une maladie grave pouvant être mortelle, surtout si elle n'est pas traitée rapidement.

TYPHIM Vi® est un vaccin utilisé pour prévenir la fièvre typhoïde. Il peut être administré aux personnes âgées de 2 ans ou plus.

Comment TYPHIM Vi® agit-il?

TYPHIM Vi® entraîne la production par le corps de sa propre protection naturelle contre la fièvre typhoïde. Votre corps commence à produire des substances appelées *anticorps* après avoir reçu le vaccin. Ces anticorps aident l'organisme à combattre la maladie. Si une personne vaccinée entre en contact avec le germe responsable de cette maladie, le corps est en général prêt à le détruire.

Il est important que les voyageurs qui se rendent dans des régions où il existe un risque reconnu d'exposition à la fièvre typhoïde se fassent vacciner au moins deux semaines avant l'exposition probable à *S. typhi*.

Cependant, comme c'est le cas pour tous les vaccins, une protection à 100 % ne peut être garantie.

Le corps ne développe pas de protection à long terme contre la fièvre typhoïde. Une vaccination de rappel 2 à 3 ans après la vaccination précédente est donc recommandée pour les personnes à risque continu d'exposition aux bactéries causant la fièvre typhoïde.

Quels sont les ingrédients de TYPHIM Vi® ?

Ingrédient médicinal : un composant purifié à partir des bactéries *Salmonella typhi*.

Ingrédients non médicinaux : phénol et solution tamponnée isotonique.

TYPHIM Vi® est offert sous les formes posologiques qui suivent :

TYPHIM Vi® est un vaccin liquide à injecter dans un muscle, en dose unique de 0,5 mL.

Vous ne devez pas recevoir TYPHIM Vi® si :

TYPHIM Vi® ne devrait pas être administré à des personnes dont on sait qu'elles souffrent d'une allergie grave à un des ingrédients du vaccin ou de son contenant ou qui ont déjà présenté une réaction allergique importante après avoir reçu un vaccin contenant des ingrédients similaires.

Consultez votre professionnel de la santé AVANT de vous faire vacciner (ou de faire vacciner votre enfant) par TYPHIM Vi®, afin de réduire la possibilité d'effets secondaires et pour assurer la bonne utilisation du médicament. Mentionnez à votre professionnel de la santé tous vos problèmes ou états de santé particuliers, notamment :

- **Forte fièvre ou affection grave.** Attendez de vous sentir mieux pour vous faire vacciner.
- **Allergie à l'un des composants du vaccin ou de son contenant,** y compris le formaldéhyde et la caséine, qui sont utilisés lors de la fabrication du vaccin et peuvent être présents dans le vaccin à l'état de traces.
- **Système immunitaire affaibli.** Il se peut que le vaccin vous confère un niveau de protection plus faible que celui observé chez les personnes dont le système immunitaire est sain. Si vous recevez un traitement qui affaiblit le système immunitaire, il est préférable d'attendre la fin du traitement pour recevoir TYPHIM Vi®.
- **Trouble de la coagulation ou prise de médicaments anticoagulants.** Informez la personne qui vous administre l'injection de votre état de santé. L'injection doit être effectuée avec soin pour éviter un saignement excessif.
- **Grossesse ou allaitement.** Il est important que vous compreniez les risques et les avantages de la vaccination. Prévenez le professionnel de la santé qui vous administre l'injection si vous êtes enceinte ou allaitez; il saura vous dire s'il est souhaitable que vous receviez TYPHIM Vi® ou non.
- **Perte de connaissance lors d'une injection précédente.** Une perte de connaissance peut survenir après la vaccination. Des mesures appropriées doivent être mises en place afin de prévenir les blessures en cas de chutes.

Informez votre professionnel de la santé de tous les produits de santé que vous prenez, y compris les médicaments, les vitamines, les minéraux, les suppléments naturels ou les produits de médecine alternative.

NE mélangez PAS TYPHIM Vi® dans la même seringue que d'autres vaccins ou produits médicamenteux. TYPHIM Vi® peut toutefois être administré avec d'autres vaccins comme ceux contre la méningite, l'hépatite A et la fièvre jaune au cours de la même visite, tant qu'ils sont injectés à des points distincts.

Comment prendre TYPHIM Vi® :

Dose habituelle :

On recommande l'administration d'une dose unique de 0,5 mL pour l'immunisation des personnes âgées de 2 ans et plus.

Le vaccin doit être administré dans un muscle, de préférence dans la région du deltoïde (épaule).

Surdosage :

Si vous pensez que vous ou une personne dont vous vous occupez avez reçu trop de TYPHIM Vi®, communiquez immédiatement avec un professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou votre centre antipoison régional, même en l'absence de symptômes.

Dose oubliée :

Sans objet pour ce vaccin.

Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à TYPHIM Vi® ?

En prenant TYPHIM Vi®, vous pourriez ressentir des effets secondaires autres que ceux qui figurent dans cette liste. Si c'est le cas, communiquez avec votre professionnel de la santé.

Comme c'est le cas avec tous les autres médicaments, un vaccin peut provoquer des problèmes graves, y compris des réactions allergiques importantes. Le risque que TYPHIM Vi® ait des effets nuisibles importants est extrêmement faible. Les faibles risques associés à TYPHIM Vi® sont nettement moindres que ceux que courent les personnes qui contractent la maladie.

Informez votre médecin, votre infirmière ou votre pharmacien dès que possible si vous ne vous sentez pas bien après avoir reçu TYPHIM Vi®.

Les effets secondaires graves sont rares.

Certaines personnes qui reçoivent TYPHIM Vi® peuvent avoir des effets secondaires bénins comme une douleur ou une sensibilité au point d'injection associée à une rougeur et à un gonflement. Les autres effets secondaires possibles fréquemment rapportés peuvent comprendre de la fièvre, des maux de tête, une sensation générale de faiblesse et d'inconfort, et des douleurs musculaires. Ces effets secondaires disparaissent habituellement en quelques jours.

En cas de symptôme ou de malaise non mentionné dans le présent document ou d'aggravation d'un symptôme ou d'un malaise vous empêchant de vaquer à vos occupations quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé.

Déclaration des effets secondaires soupçonnés des vaccins

Pour le grand public : Si vous ressentez un effet secondaire à la suite d'une vaccination, veuillez le signaler à votre professionnel de la santé.

Si vous souhaitez obtenir des informations sur l'atténuation des effets secondaires, veuillez contacter votre professionnel de la santé. L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC), Santé Canada et Sanofi ne peuvent pas fournir de conseils médicaux.

Pour les professionnels de la santé : Si un patient ressent un effet secondaire à la suite d'une vaccination, veuillez remplir le formulaire approprié de rapport des effets secondaires suivant l'immunisation (ESSI) selon votre province ou territoire (<https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/immunisation/declaration-manifestations-cliniques-inhabituelles-suite-immunisation/formulaire.html>) et l'envoyer à votre unité de santé locale.

Entreposage :

Conserver le vaccin au réfrigérateur entre 2 et 8 °C (35 et 46 °F). **Ne pas congeler.** Jeter le produit s'il a été exposé au gel.

Protéger de la lumière.

Garder hors de la portée et de la vue des enfants.

Pour en savoir davantage au sujet de TYPHIM Vi® , vous pouvez :

- Communiquer avec votre professionnel de la santé.
- Lire la monographie de produit intégrale rédigée à l'intention des professionnels de la santé, qui renferme également les renseignements sur le médicament pour le patient. Ce document est publié sur le site Web de Santé Canada (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html>) ou le site Web de Sanofi Canada (www.sanofi.ca/fr), ou peut être obtenu en téléphonant au fabricant, Sanofi, au 1-888 621-1146 (numéro gratuit).

Ce dépliant a été rédigé par Sanofi Vaccins Canada Ltée.

Dernière révision : 8 mars 2024