

TOUJEO® (INSULIN GLARGIN 300 enheder/ml)



Toujeo® 300 enheder/ml SoloStar®, injektionsvæske, opløsning i fyldt pen
Toujeo® 300 enheder/ml DoubleStar™, injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

VEJLEDNING TIL PATIENTER OG/ELLER OMSORGSPERSONER:

- Hvis du har fået ordineret Toujeo®, skal lægen eller andet sundhedspersonale instruere dig i, hvordan du bruger Toujeo® pennen, og du skal læse hele brugsanvisningen i indlægssedlen, som følger med pennen.
- Dette dokument er kun vejledende.
- Start med den dosis, der er angivet i enheder på din recept.

Vigtige oplysninger for de første uger efter du har fået ordineret Toujeo®

- Selvom Insulin glargin 300 enheder/ml (Toujeo®) indeholder det samme aktive stof som insulin glargin 100 enheder/ml, er de to lægemidler ikke ens, og du kan derfor ikke skifte mellem dem uden at din dosis skal justeres.
- Du må kun skifte fra en insulinbehandling til en anden, hvis lægen har ordineret det. Du skal altid følge den dosis, som din læge har ordineret.
- Dit blodsukker skal overvåges nøje under et skift og i de efterfølgende uger.
- Insulin glargin 300 enheder/ml fås i to forskellige udgaver:



Pennens dosistrin er 1 enhed for Toujeo® SoloStar® og 2 enheder for Toujeo® DoubleStar™.

Den dosis, der afgives, er vist i dosisvinduet.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet for yderligere information.

Før injektion med Toujeo® skal du læse brugsanvisningen, som er en del af indlægssedlen.

Hvis du oplever medicineringsfejl eller bivirkninger, skal du fortælle det til lægen eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i indlægssedlen.

Du kan også indberette bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen via www.meldenbivirkning.dk eller alternativt til Sanofi på telefon 45 16 70 00 eller på e-mail Pharmacovigilance.denmark@sanofi.com