

Carte patient pour le thiocolchicoside (à usage systémique)

Le thiocolchicoside est un relaxant musculaire. Sous ses formes systémiques (comprimés/gélules par voie orale ou injection intramusculaire), il est **utilisé chez les adultes et les adolescents à partir de 16 ans en tant que traitement d'appoint des contractions musculaires douloureuses**. Il est utilisé pour des affections aiguës liées à la colonne vertébrale.

Avant de prendre le thiocolchicoside (à usage systémique), vous devez savoir que :

L'un des produits formés dans votre corps lors de la prise de thiocolchicoside a été démontré comme étant susceptible de causer **des dommages à certaines cellules (nombre anormal de chromosomes)** chez les animaux et dans des études en laboratoire sur les cellules. **Chez l'homme, ce type d'endommagement des cellules est un facteur de risque pour le développement anormal de l'enfant à naître, l'altération de la fertilité masculine et un facteur de risque potentiel de cancer.**

Prenez toujours ce médicament exactement comme votre médecin ou votre pharmacien vous l'a indiqué.

Vous **NE DEVEZ PAS PRENDRE** du thiocolchicoside (à usage systémique) si :

- Vous êtes enceinte ou pensez l'être
- Vous allaitez
- Vous êtes une femme en âge de procréer et n'utilisez pas de contraception efficace (pendant le traitement et pendant un mois après l'arrêt du traitement)
- Vous êtes un homme n'utilisant pas de mesures contraceptives efficaces (pendant le traitement et pendant trois mois après l'arrêt du traitement)

Ne **dépassez pas les doses recommandées et la durée de traitement**, qui sont respectivement de :

- **8 mg toutes les 12 heures** (soit 16 mg par jour) pour la **forme orale**, limitée à **7 jours consécutifs**.
- **4 mg toutes les 12 heures** (soit 8 mg par jour) pour la forme **intramusculaire**, limitée à **5 jours consécutifs**.

Contactez votre médecin :

- Immédiatement en cas de suspicion de grossesse

Ces médicaments font l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.

Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le Centre Antipoison et de Pharmacovigilance du Maroc. Site internet : www.capm-santé.ma. Tél : **0801 000 180**. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir d'avantage d'informations sur la sécurité du médicament.

Pour signaler un cas de pharmacovigilance concernant un produit Sanofi, vous pouvez nous contacter par email à : pharmacovigilance.maroc@sanofi.com

Pour toute question ou demande d'informations complémentaires, vous pouvez contacter le laboratoire Sanofi-Aventis Maroc via E-mail : infomed.mco@sanofi.com ou par téléphone au **00212 522 66 90 00**