

Xenpozyme®
(olipudase alfa)

بطاقة المريض

sanofi

MAT-MA-2500293

اسم المريض :

الطبيب الموصي :

الاسم :

الهاتف :

المستشفى / المركز :

الاسم :

جهة الاتصال في حالة الطوارئ (الهاتف) :

إذا شعرت بأي تأثير جانبي، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي أو الممرض(ة).

يمكنك أيضاً الإبلاغ عن الآثار الجانبية في غضون 24 ساعة مباشرة عبر بوابة الإبلاغ عن الأحداث الصحية غير المرغوب فيها التابعة لوزارة الصحة على العنوان التالي : **capm santé.ma** و/أو عبر قسم مراقبة الأدوية في شركة سانوفي عبر الهاتف على الرقم **00212522669000** أو عبر البريد الإلكتروني : **pharmacovigilance.maroc@sanofi.com**

تحتوي هذه البطاقة على معلومات مهمة تتعلق بالسلامة يجب أن تكون على دراية بها أثناء العلاج. يرجى الرجوع إلى النشرة للحصول على مزيد من المعلومات.

احتفظ بهذه البطاقة معك وقدمها لكل طبيب أو صيدلي أو ممرض(ة) يشارك في رعايتك. امسح رمز QR لعرض المعلومات حول XENPOZYME®



▼ هذا الدواء يخضع لمراقبة إضافية مما سيسمح بالكشف السريع عن معلومات جديدة تتعلق بالسلامة.

خطر التفاعلات المرتبطة بالتسريب الوريدي (RAP)

يمكن أن يؤدي التسريب الوريدي لـ XENPOZYME® إلى حدوث تفاعل، قد يكون شديداً في بعض الأحيان، ويجب معالجته فوراً. استشر طبيباً على وجه السرعة إذا ظهرت أي من العلامات أو الأعراض التالية أو ساءت أثناء التسريب أو بعده :

- ضيق في التنفس / اختناق
- دوخة، ضعف أو إغماء
- احمرار وشحوب الجلد، شرى (أرتيكاريا)، حكة
- نبض ضعيف وسريع
- غثيان، تقيؤ أو إسهال

بلغ طبيبك الموصي بـ XENPOZYME® عن هذا الحدث.

بالنسبة للنساء في سن الإنجاب، بما في ذلك المراهقات

يُنصح باستخدام وسيلة فعالة لمنع الحمل أثناء فترة العلاج وحتى 14 يوماً بعد الجرعة الأخيرة في حال تم إيقاف XENPOZYME®. ناقشي مع طبيبك الموصي الحاجة إلى اتخاذ تدابير لمنع الحمل.

اتصلي بطبيبك الموصي إذا كنتِ تظنين أنكِ حامل أو إذا كنتِ تخططين للحمل.

أخبري طبيبك أيضاً إذا كنتِ تقومين بالرضاعة الطبيعية أو تنوين إرضاع طفلك.