

دليل المريض و / أو مقدمي الرعاية

يتم توفير هذا الدليل للنصائح والتوجيهات فقط. قبل استخدام سوليکوا، يجب أن يتم تدريبك على كيفية استخدام قلم سوليکوا سولوستار® من قبل طبيبك ، ويجب عليك القراءة بعناية واتباع دائماً "دليل الاستعمال" الذي تحتوي عليه النشرة المصاحبة للقلم.

احتفظ بهذا الدليل. قد تحتاج للرجوع إليه لاحقاً. اكتب اسمك هنا :

يحتوي قلم سوليکوا المعبأ مسبقاً على الأنسولين غلارجين والليكزيسيناتيد ، يهدف الجمع ما بين الدوائين في هذا القلم إلى إعطاء حقنة واحدة يومية

يتوفر سوليکوا على هيئة قلمين مملوءين مسبقاً ، يحتويان على كميات مختلفة من الليكزيسيناتيد وتقدم مستويات مختلفة من جرعات وحدة الأنسولين . غلارجين 100 وحدة /مل وصف لك طبيبك القلم الذي يلبي احتياجاتك من الأنسولين .

40-10

سوليکوا قلم

60-30

سوليکوا

سوليکوا 100 وحدة/مل + 50 ميكروغرام/مل
محلول للحقن في قلم معبأ مسبقاً

سوليکوا 100 وحدة/مل + 33 ميكروغرام/مل
محلول للحقن في قلم معبأ مسبقاً



- يحتوي كل من الأقلام المعبأة مسبقاً على الأنسولين غلارجين 100 وحدة / مل.
- يجب استخدام قلم سوليکوا (40-10) لإعطاء جرعة من 10 إلى 40 وحدة في حقنة واحدة في اليوم (التركيز: أنسولين غلارجين 100 وحدة / مل والليكزيسيناتيد 50 µg / مل ، نطاق الجرعة : من 10 إلى 40 وحدة من الأنسولين غلارجين بالإضافة إلى 5 إلى 20 µg الليكزيسيناتيد) هذا القلم بلون خوخ مع زر حقن برتقالي
- يجب استخدام قلم سوليکوا (60-30) لإعطاء جرعة من 30 إلى 60 وحدة في حقنة واحدة في اليوم (التركيز: أنسولين غلارجين 100 وحدة / مل والليكزيسيناتيد 33 µg / مل ، نطاق الجرعة : من 30 إلى 60 وحدة من الأنسولين غلارجين بالإضافة إلى 10 إلى 20 µg الليكزيسيناتيد) هذا القلم بلون أخضر مع زر حقن بني
- تحتوي كل جرعة مختارة من سوليکوا على وحدة أنسولين غلارجين 100 وحدة/مل بالإضافة إلى كمية مقابلة من الليكزيسيناتيد.
- قبل استعمال سوليکوا، يجب أن تعرف بالضبط عدد الجرعات والوحدات التي تحتاجها. سيزودك طبيبك بهذه المعلومات
- تقوم نافذة عرض الجرعات بعدد الوحدات المراد حقنها
- يجب أن يذكر في الوصفة الطبية نوع القلم المعبأ مسبقاً الذي تحتاجه، قلم سوليکوا (40-10) أو قلم سوليکوا (60-30) وعدد الجرعات المراد حقنها
- يجب أن يوضح الصيدلي مع طبيبك أي وصفة طبية غير مكتملة

معلومات للمرضى و/ أو مقدمي الرعاية

ملاحظة:

- يتم توفير سوليكوفا في قلم جاهز للإستعمال ويجب استخدامه فقط مع هذا الجهاز. يجب ألا يستخدم المرضى ومقدمو الرعاية و الأطباء والمهنيين الصحيين أبداً حقنة لسحب سوليكوفا من قلم مملوء مسبقاً ، حيث قد ينتج عن ذلك أخطاء في الجرعات وضرر جسيم. خذ إبرة جديدة عند كل استعمال. لا ينبغي إعادة استخدام الإبر.
- تحتوي وحدة واحدة من سوليكوفا دائماً على وحدة واحدة من الأنسولين غلارجين 100 وحدة / مل، بغض النظر عن قلم سوليكوفا المعبأ مسبقاً والجهاز للاستخدام (قلم [10-40] أو قلم [30-60]).
- يمكن لأخصائيي الرعاية الصحية الخاص بك شرح تصميم وميزات قلم سوليكوفا سولوستار، بما في ذلك كيفية قراءة نافذة الجرعة وعدّ الوحدات المراد حقنها.
- أثناء التحول إلى هذا النوع من الأدوية المركبة وفي الأسابيع التالية، يجب قياس نسبة السكر في الدم بشكل متكرر.
- إذا كانت لديك أي أسئلة حول علاجك، فلا تتردد في التحدث إلى طبيبك.

قبل استعمال سوليكوفا

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل البدء باستعمال هذا الدواء و اتبع دائماً "دليل الاستعمال" الذي تحتوي عليه هذه النشرة إذا لم تتبع كل هذه التعليمات، فإنك تخاطر بحقن الكثير أو القليل من الدواء.

إذا ظهرت لديك أي آثار جانبية، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي. ينطبق هذا أيضاً على أي تأثير غير مرغوب فيه غير مذكور في النشرة. يمكنك أيضاً الإبلاغ عن الآثار الجانبية لـ Sanofi عبر الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني



للإبلاغ عن حالة آثار جانبية لهذا الدواء ، يمكنك الاتصال بنا عبر الهاتف على: 00 212 522 66 90 00

أو عن طريق البريد الإلكتروني : pharmacovigilance.maroc@sanofi.com

إذا كان لديك أي أسئلة حول أحد منتجاتنا ، فاتصل بنا على العنوان التالي : infomed.mco@sanofi.com أو عبر الهاتف على : 00 212 522 66 90 00



Sanofi-aventis Maroc Route de Rabat R.P 1,
Ain Sbaâ. 20250 CASABLANCA MAROC

الهاتف : 00 212 522 66 90 00

www.sanofi.ma