



harde capsules
eliglustat

RISICOMINIMALISATIE-MATERIAAL OVER DE RISICO'S VAN ELIGLUSTAT VOOR VOORSCHRIJVERS

Risicominimalisatie-materiaal over de risico's van eliglustat voor voorschrijvers

Dit materiaal beschrijft aanbevelingen om belangrijke risico's van eliglustat te beperken of te voorkomen. Het materiaal is beoordeeld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Eliglustat is geïndiceerd voor de langetermijnbehandeling van volwassen patiënten met de ziekte van Gaucher type 1 (GD I), die CYP2D6-trage (poor metabolisers, PMs), intermediaire (intermediate metabolisers, IMs) of extensieve metaboliseerders (extensive metabolisers, EMs) zijn.

Eliglustat is ook geïndiceerd voor pediatrische patiënten met GD1 van 6 jaar en ouder met een minimaal lichaamsgewicht van 15 kg, die stabiel zijn op enzymvervangings therapie (ERT) en die CYP2D6 PM's, IM's of EM's zijn.

Dit materiaal is ontwikkeld als onderdeel van het educatieve programma eliglustat en is bedoeld voor artsen die de behandeling met eliglustat initiëren en begeleiden. Het is bedoeld om het gebruik van eliglustat te verbeteren door het positief beïnvloeden van de juiste acties.

Het bevat:

1. Een checklist van de acties die moeten worden uitgevoerd voor en na de start van de behandeling
2. Informatie over CYP2D6 genotypering beoordeling
3. Informatie over het melden van mogelijke bijwerkingen

Er is extra materiaal voor de patiënt en/of verzorgers van de patiënt. Zorgverleners worden verzocht dit materiaal aan de patiënt of zijn/haar ouders of verzorgers mee te geven.

Indien nodig, zijn er op verzoek extra **patiëntenkaarten** te verkrijgen via de afdeling Medische Informatie van Sanofi, te bereiken via het algemene nummer: +31 (0)20 2454 000.

Deze kaart is een hulpmiddel om elke zorgverlener die patiënten die eliglustat gebruiken behandelt, te informeren over geneesmiddelinteracties die moeten worden overwogen vóór het voorschrijven of toedienen van aanvullende geneesmiddelen, inclusief kruidengeneesmiddelen.

De patiënt (of verzorgers wanneer van toepassing) moet worden verteld deze kaart bij zich te dragen en dat deze moet worden getoond aan elke zorgverlener die aanvullende geneesmiddelen voorschrijft of toedient. Bovendien bevat deze kaart informatie om de patiënt en/of verzorgers te wijzen op het risico van zelfmedicatie en consumptie van grapefruit- en pompoelmoesproducten. Een voorbeeld van deze kaart is bijgevoegd in **bijlage 1**.

Voor meer informatie over eliglustat verwijzen wij u naar de Samenvatting van de productkenmerken of neem contact op met de afdeling Medische Informatie van Sanofi, te bereiken via het algemeen nummer: +(0)20 2454 000.

Tevens willen wij u wijzen op de Gaucher Registry, de grootste observationele studie van patiënten met de ziekte van Gaucher wereldwijd. Voor meer informatie over de Gaucher Registry en het registreren van uw patiënten, gaat u naar www.registrynxt.com/

1 Checklist voor de voorschrijver

1. Voordat de behandeling wordt gestart, moet worden nagegaan of de patiënt geschikt is voor een behandeling met eliglustat:

Er moet aan drie stappen worden voldaan om te bevestigen dat de patiënt geschikt is om met de behandeling van eliglustat te starten:

Stap 1	De patiënt moet een volwassen patiënt zijn met de ziekte van Gaucher type 1 (GD1) of pediatrie patiënt (van 6 tot <18 jaar) met GD1, met een minimum lichaamsgewicht van 15 kg, die stabiel is op enzymvervangings therapie (ERT) en die een intacte capsule kan doorslikken			
Stap 2	De patiënt moet een CYP2D6-trage (PM), intermediaire (IM) of extensieve metaboliseerder (EM) zijn			
Stap 3	Afhankelijk van het CYP2D6-fenotype van de patiënt, gedefinieerd bij stap 2, moet rekening worden gehouden met de volgende situaties, op basis van het gebruik van gelijktijdige medicatie, evenals de lever- en nierstatus. Raadpleeg voor meer informatie de Samenvatting van de Productkenmerken:			
	CYP2D6 fenotype	Extensieve metaboliseerder (EM)	Intermediaire metaboliseerder (IM)	Trage metaboliseerder (PM)
	Standaarddosering voor volwassenen	84 mg tweemaal daags (BID)	84 mg tweemaal daags	84 mg eenmaal daags (QD)
	Standaarddosering voor kinderen van 6 jaar tot < 18 jaar met lichaamsgewicht van:	≥ 50 kg	84 mg tweemaal daags	84 mg eenmaal daags
		25 to < 50 kg	84 mg tweemaal daags	42 mg eenmaal daags
		15 to < 25 kg	42 mg tweemaal daags	21 mg eenmaal daags
	Gelijktijdig gebruik van CYP2D6- en/of CYP3A-remmers verhoogt de plasmaconcentraties van eliglustat:			
	Sterke of matige CYP2D6-remmers + sterke of matige CYP3A-remmers	Gecontra-indiceerd	Gecontra-indiceerd	Zie hieronder voor sterke of matige CYP3A-remmers
	Sterke CYP2D6-remmers	Eenmaal daagse dosis	Eenmaal daagse dosis	Eenmaal daagse dosis

Stap 3

CYP2D6 fenotype	Extensieve metaboliseerder (EM)	Intermediaire metaboliseerder (IM)	Trage metaboliseerder (PM)
Matige CYP2D6-remmers	Tweemaal daagse dosis met de nodige voorzichtigheid	Tweemaal daagse dosis met de nodige voorzichtigheid	Eenmaal daagse dosis
Sterke CYP3A-remmers	Tweemaal daagse dosis met de nodige voorzichtigheid	Tweemaal daagse dosis met de nodige voorzichtigheid	Gecontra-indiceerd
Matige CYP3A-remmers	Tweemaal daagse dosis met de nodige voorzichtigheid	Tweemaal daagse dosis met de nodige voorzichtigheid	Niet aanbevolen
Zwakke CYP3A-remmers	Tweemaal daagse dosis	Tweemaal daagse dosis	Eenmaal daagse dosis met de nodige voorzichtigheid

Grapefruit- of pompelmoesproducten vallen onder de categorie sterke CYP3A-remmers en kunnen de plasmaconcentraties van eliglustat verhogen. **Consumptie van grapefruit of het sap ervan moet worden vermeden.**

Gelijktijdig gebruik van sterke CYP3A-inductoren verlaagt de plasmaconcentraties van eliglustat:

Sterke CYP3A-inductoren	Niet aanbevolen	Niet aanbevolen	Niet aanbevolen
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Gelijktijdig gebruik van middelen waarvan de blootstelling kan worden verhoogd door eliglustat:

P-gp-substraten	Het kan nodig zijn om de doses van stoffen die P-gp-substraten zijn, te verlagen		
CYP2D6-substraten	Het kan nodig zijn om de doses van geneesmiddelen die CYP2D6- substraten zijn, te verlagen		
Patiënten met afgenomen leverfunctie	(EM)	(IM)	(PM)
Licht afgenomen leverfunctie	Tweemaal daagse dosis	Niet aanbevolen	Niet aanbevolen
Licht afgenomen leverfunctie EN gebruik van een zwakke CYP2D6-remmer OF een CYP3A-remmer	Eenmaal daagse dosis	Niet aanbevolen	Niet aanbevolen

Stap 3	CYP2D6 fenotype	Extensieve metaboliseerder (EM)	Intermediaire metaboliseerder (IM)	Trage metaboliseerder (PM)
	Licht afgenomen leverfunctie EN gebruik van een sterke of matige CYP2D6-remmer	Gecontra-indiceerd	Niet aanbevolen	Niet aanbevolen
	Matig afgenomen leverfunctie	Niet aanbevolen	Niet aanbevolen	Niet aanbevolen
	Matig afgenomen leverfunctie EN gebruik van een sterke of matige CYP2D6-remmer	Gecontra-indiceerd	Niet aanbevolen	Niet aanbevolen
	Ernstig afgenomen leverfunctie	Gecontra-indiceerd	Niet aanbevolen	Niet aanbevolen
	Patiënten met verminderde nierfunctie	(EM)	(IM)	(PM)
	Licht, matig of ernstig verminderde nierfunctie	Tweemaal daagse dosis	Niet aanbevolen	Niet aanbevolen
	Terminale nierziekte (end stage renal disease, ESRD)	Niet aanbevolen	Niet aanbevolen	Niet aanbevolen

2. Patiënteneducatie

- U heeft de patiënt/verzorger ingelicht over de interacties met andere geneesmiddelen die met eliglustat kunnen optreden en over het belang van het informeren van alle zorgverleners over de huidige medicatie en de behandeling van de patiënt
- U heeft de patiënt/verzorger over het risico van zelfmedicatie en consumptie van grapefruit- en pompelmoesproducten ingelicht
- U heeft de patiëntenkaart aan de patiënt/verzorger overhandigd/en hem/haar geïnstrueerd over het gebruik ervan (d.w.z. u heeft met hem/haar het belang van het tonen van de kaart aan al zijn/haar zorgverleners besproken)

CONTROLEER HET VOLGENDE BIJ VERVOLGBEZOeken VAN DE PATIËNT:

3. Medische aandoeningen

- Informeert over eventuele wijzigingen in de medische voorgeschiedenis of nieuwe geneesmiddelen sinds het laatste bezoek (inclusief vrij verkrijgbare medicijnen of kruidengeneesmiddelen) en het gebruik van grapefruit- en pompelmoesproducten
- Controleert op mogelijke bijwerkingen

4. Patienteneducatie

- Controleert op het juiste gebruik van de patiëntenkaart
- Herinnert de patiënt/verzorger aan het risico van zelfmedicatie en aan het vermijden van consumptie van grapefruit- en pompelmoesproducten

2 Voorspelde cytochroom-P450-2D6 metabole activiteit

Eliglustat dient alleen bij patiënten met een voorspeld fenotype CYP2D6-trage, -intermediaire of -extensieve metaboliseerder, gebaseerd op genotypering, te worden gebruikt. Het is een vereiste om het CYP2D6-fenotype van de patiënt te bepalen, alvorens te starten met eliglustat.

Genotypering om het CYP2D6-fenotype van de patiënt te bepalen dient te worden uitgevoerd met behulp van een gestandaardiseerde genetische laboratoriumtest die in staat is om een specifieke set van CYP2D6-allelen met voldoende nauwkeurigheid, gevoeligheid en specificiteit op te sporen, om de consistente identificatie van CYP2D6- metaboliseerder-status te verzekeren. Er zijn verschillende geschikte commerciële tests beschikbaar.

Voor meer informatie over geaccrediteerde laboratoria kunt u contact opnemen met de afdeling Medische Informatie van Sanofi op het algemeen nummer: +(0)20 2454 000.

3 Meld bijwerkingen bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb

▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld.

Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico's van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via: Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb Website: www.lareb.nl.

U kunt extra materiaal opvragen via <https://www.sanofi.com/nl/nederland/cerdelga>.

Aanvullende informatie betreffende eliglustat is beschikbaar in de Samenvatting van productkenmerken (SmPC) en bijsluiter op www.cbg-meb.nl.

Het additioneel risicominimalisatie-materiaal is online beschikbaar op <https://www.sanofi.com/nl/nederland/cerdelga>.

Bijlagen

Bijlage 1 : Patiëntenkaart

