



GUÍA DE VALPROATO PARA PACIENTES DE SEXO MASCULINO

*Lea esta guía
junto con el folleto de
información para el paciente
para obtener información
completa del producto.*

VALPROATO **Valpakine**

LO QUE DEBE SABER

Esta guía contiene información clave sobre el riesgo potencial de Valpakine cuando los pacientes de sexo masculino lo utilizan en los 3 meses previos a la concepción de un niño.

Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.

CONSERVE ESTA GUÍA. ES POSIBLE QUE DEBAS VOLVER A LEERLO.

¿Cuáles son los riesgos de tomar valproato* al concebir un niño?

Un estudio sugiere un posible riesgo de trastornos del movimiento y del desarrollo mental (problemas con el desarrollo temprano de la infancia) en niños nacidos de padres tratados con valproato en los 3 meses previos a la concepción.

En este estudio, alrededor de 5 niños de cada 100 tuvieron tales trastornos cuando nacieron de padres tratados con valproato, en comparación con alrededor de 3 niños de cada 100 cuando nacieron de padres tratados con lamotrigina o levetiracetam (otros medicamentos que pueden usarse para tratar su enfermedad).

Sin embargo, el estudio tiene limitaciones y, por lo tanto, no está del todo claro si el aumento del riesgo y trastornos del desarrollo mental y movimiento sugeridos por este estudio es causado por el valproato.

En el estudio se investigó una amplia gama de trastornos del movimiento y del desarrollo mental. Sin embargo, el estudio no fue lo suficientemente grande como para mostrar qué tipo particular de trastorno pueden estar en riesgo de desarrollarse niños. Por ejemplo, los problemas con el movimiento y el desarrollo mental de su hijo a medida que crece pueden incluir:

- Problemas de movimiento
- Una inteligencia más baja que otros niños de la misma edad
- Habilidades deficientes del habla y del lenguaje.
- Problemas del espectro autista o autismo
- Trastorno de déficit de atención y/o hiperactividad

Se desconoce el riesgo para los niños nacidos de padres que interrumpieron el tratamiento con valproato 3 meses (el tiempo necesario para formar espermatozoides nuevos) o más antes de la concepción.

¿Qué significa esto para mí?

Como medida preventiva, su médico analizará con usted el posible riesgo en niños nacidos de padres tratados con valproato en los 3 meses previos a la concepción.

Su médico también analizará con usted lo siguiente:

- La necesidad de considerar un **método anticonceptivo eficaz** (control de la natalidad) para usted y su pareja del género femenino durante el uso de valproato y durante 3 meses después de interrumpir el uso de valproato (el tiempo necesario para que se forme un nuevo espermatozoides).
- La necesidad de consultar a su médico cuando **esté planeando concebir un hijo** y antes de interrumpir la anticoncepción (control de la natalidad).
- La posibilidad de **otros tratamientos** que puedan usarse para tratar su enfermedad, dependiendo de su situación individual.

No done espermatozoides mientras toma valproato y durante 3 meses después de interrumpir el tratamiento con valproato.

Hable con su médico si está pensando en tener un bebé.

Si su **pareja del género femenino queda embarazada** mientras usted usaba valproato en los 3 meses previos a la concepción y tiene preguntas, **comuníquese con su médico**.

No interrumpa su tratamiento sin hablar con su médico. Si interrumpe su tratamiento, sus síntomas pueden empeorar.

Debe **obtener citas regulares** con su médico que emitió la receta.

Durante esta visita, su médico analizará con usted las precauciones asociadas con el uso de valproato y la posibilidad de otros tratamientos que puedan usarse para tratar su enfermedad, según su situación individual.

*Valproato también conocido como **Valpakine**

CONSULTE EL FOLLETO DE INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE PARA OBTENER INFORMACIÓN MÁS DETALLADA.



sanofi