Niniejsza Karta Pacjenta zawiera ważne informacje, o których należy wiedzieć w trakcie przyjmowania XENPOZYME. Pełne informacje są podane w dołączonej do opakowania ulotce dla pacjenta.

Informacje ogólne

Prosimy pokazać tę kartę każdemu lekarzowi lub członkowi zespołu pielęgniarskiego, który zapewnia Państwu opiekę.

XENPOZYME
(olipudaza alfa)

Istotne działania niepożądane

XENPOZYME jest podawany w postaci infuzji dożylnej. W rzadkich przypadkach podczas infuzji lub po jej zakończeniu pacjenci mogą doznać ciężkiej reakcji alergicznej, w związku z którą należy natychmiast zastosować leczenie.
Należy bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej w przypadku wystąpienia następujących dolegliwości i objawów bądź w przypadku ich nasilenia podczas infuzji lub po jej zakończeniu:

- Zadyszka/ zadławienie
- Zawroty głowy, osłabienie lub omdlenie
- Słaby i szybki puls
- Nudności, wymioty lub biegunka
- Rozgrzana i blada skóra, pokrzywka, swędzenie

Prosimy zgłaszać wszelkie zdarzenia lekarzowi przepisującemu lek/prowadzącemu.

Informacja dla kobiet zdolnych do posiadania potomstwa, w tym nastoletnich dziewcząt

Zaleca się stosowanie skutecznej antykoncepcji podczas leczenia i przez 14 dni po przyjęciu ostatniej dawki, jeśli odstawiono olipudazę alfa.

Prosimy omówić potrzebę stosowania skutecznej antykoncepcji z lekarzem przepisującym lek/prowadzącym.

Prosimy o kontakt z lekarzem przepisującym lek/prowadzącym, jeśli sądzi Pani, że może być w ciąży, lub planuje zajście w ciążę i karmić piersią.

XENPOZYME (olipudaza alfa)

WAŻNA INFORMACJA

KARTA PACJENTA

Imię i nazwisko pacjenta:

_____

Lekarz <przepisujący lek/prowadzący>:

- Imię i nazwisko:
  .....
- Kontakt (nr telefonu):
  .....

_____

Szpital/ośrodek:

- Imię i nazwisko:
  .....
- Kontakt w sytuacjach nagłych (nr telefonu):
  .....

PL.EDU.OLI.25.09.01

sanofi

Co to jest XENPOZYME?

XENPOZYME jest lekiem zawierającym sztuczny enzym, olipudazę alfa, jako substancję czynną. Służy on jako zamiennik enzymu zwanego kwaśną sfingomielinazą (ASM), aby uzupełnić jej poziom u pacjentów z deficytem ASM (ASMD). U tych pacjentów aktywność ASM jest niższa od prawidłowej lub całkowicie nieistniejąca, co może prowadzić do różnych objawów.
XENPONZYME jest wskazany jako enzymatyczna terapia zastępcza w leczeniu obserwowanych poza ośrodkowym układem nerwowym objawów ASMD u dzieci i dorosłych z typem A/B lub typem B.

Co to jest XENPOZYME?

XENPOZYME jest lekiem zawierającym sztuczny enzym, olipudazę alfa, jako substancję czynną. Służy on jako zamiennik enzymu zwanego kwaśną sfingomielinazą (ASM), aby uzupełnić jej poziom u pacjentów z deficytem ASM (ASMD). U tych pacjentów aktywność ASM jest niższa od prawidłowej lub całkowicie nieistniejąca, co może prowadzić do różnych objawów.
XENPONZYME jest wskazany jako enzymatyczna terapia zastępcza w leczeniu obserwowanych poza ośrodkowym układem nerwowym objawów ASMD u dzieci i dorosłych z typem A/B lub typem B.

Imię i nazwisko pacjenta:

_____

Lekarz <przepisujący lek/prowadzący>:

- Imię i nazwisko:

.....

- Kontakt (nr telefonu):

.....

_____

Szpital/ośrodek:

- Imię i nazwisko:

.....

- Kontakt w sytuacjach nagłych (nr telefonu):

.....

XENPOZYME (olipudaza alfa)

WAŻNA INFORMACJA

KARTA PACJENTA

PL.EDU.OLI.25.09.01

sanofi

Istotne działania niepożądane

XENPOZYME jest podawany w postaci infuzji dożylnej. W rzadkich przypadkach podczas infuzji lub po jej zakończeniu pacjenci mogą doznać ciężkiej reakcji alergicznej, w związku z którą należy natychmiast zastosować leczenie.
Należy bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej w przypadku wystąpienia następujących dolegliwości i objawów bądź w przypadku ich nasilenia podczas infuzji lub po jej zakończeniu:

- Zadyszka/ zadławienie
- Zawroty głowy, osłabienie lub omdlenie
- Słaby i szybki puls
- Nudności, wymioty lub biegunka
- Rozgrzana i blada skóra, pokrzywka, swędzenie

Prosimy zgłaszać wszelkie zdarzenia lekarzowi przepisującemu lek/prowadzącemu.

Informacja dla kobiet zdolnych do posiadania potomstwa, w tym nastoletnich dziewcząt

Zaleca się stosowanie skutecznej antykoncepcji podczas leczenia i przez 14 dni po przyjęciu ostatniej dawki, jeśli odstawiono olipudazę alfa.

Prosimy omówić potrzebę stosowania skutecznej antykoncepcji z lekarzem przepisującym lek/prowadzącym.

Prosimy o kontakt z lekarzem przepisującym lek/prowadzącym, jeśli sądzi Pani, że może być w ciąży, lub planuje zajście w ciążę i karmić piersią.

Niniejsza Karta Pacjenta zawiera ważne informacje, o których należy wiedzieć w trakcie przyjmowania XENPOZYME. Pełne informacje są podane w dołączonej do opakowania ulotce dla pacjenta.

Informacje ogólne

Prosimy pokazać tę kartę każdemu lekarzowi lub członkowi zespołu pielęgniarskiego, który zapewnia Państwu opiekę.

Więcej informacji można uzyskać po zeskanowaniu kodu QR.

XENPOZYME
(olipudaza alfa)