

_____ Numer telefonu lekarza prowadzącego:

_____ Imię i nazwisko lekarza prowadzącego:

_____ Nazwa ośrodka:

_____ Data przepisania leku Aubagio® po raz pierwszy:

_____ Imię i nazwisko pacjenta:

KARTA INFORMACYJNA DLA PACJENTA

Niniejsza Karta informacyjna dla pacjenta zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, o których pacjent powinien wiedzieć przed rozpoczęciem stosowania leku Aubagio®. Pełne informacje przedstawiono w ulotce dla pacjenta.



Ogólne wskazówki

Należy pokazywać tę Kartę każdemu lekarzowi i (lub) osobie z fachowego personelu medycznego, uczestniczącym w leczeniu pacjenta (np. w przypadkach stanów nagłych).

1 raz na dobę
AUBAGIO®
(teryflunomid) 14mg
100% czystość

AUBAGIO jest dostępny w tabletkach 14mg i 7mg.

PL.EDU.TER.21.08.02

SANOFI GENZYME 



Istotne działania niepożądane

Lek ten może wpływać na czynność wątroby i niektóre komórki krwi (krwinki), które są istotne dla zwalczania zakażeń. Z tego powodu przed rozpoczęciem leczenia należy wykonać badanie krwi i pomiar ciśnienia tętniczego, a następnie regularnie je powtarzać.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących działań niepożądanych:

- Zażółcenie skóry lub białkówki oczu, ciemne zabarwienie moczu, nudności lub wymioty i bóle brzucha. W takim przypadku mogą u Pana/Pani występować problemy z wątrobą.
- Wysoka temperatura (gorączka), kaszel, dreszcze, powiększenie węzłów chłonnych, zmniejszone lub bolesne oddawanie moczu. W takim przypadku może u Pana/Pani występować zakażenie.



Dla kobiet w wieku rozrodczym, w tym dziewcząt i ich rodziców/opiekunów

- Nie należy rozpoczynać stosowania leku Aubagio®, jeżeli jest Pani w ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży. W celu potwierdzenia lekarz może poprosić Panią o wykonanie testu ciążowego.
- Należy stosować skuteczną antykoncepcję podczas leczenia i po zakończeniu leczenia Aubagio. Lekarz udzieli Pani informacji dotyczących potencjalnego ryzyka dla płodu i konieczności stosowania skutecznej antykoncepcji.
- Jeżeli chce Pani zmienić metodę antykoncepcji lub planuje zajście w ciążę, należy skontaktować się ze swoim lekarzem.
- Jeżeli zajdzie Pani w ciążę lub będzie Pani podejrzewała, że jest Pani w ciąży, należy przerwać stosowanie leku Aubagio i natychmiast poinformować o tym swojego lekarza.
- W przypadku ciąży lekarz może zasugerować leczenie pewnymi lekami, aby przyspieszyć eliminację leku Aubagio z Pani organizmu.
- Powinna Pani również porozmawiać ze swoim lekarzem, jeżeli planuje Pani karmienie piersią lub obecnie karmi Pani piersią.
- Dotyczy rodziców/opiekunów lub dziewczynek: kiedy u pacjentki po raz pierwszy wystąpi miesiączka, należy skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania porady na temat potencjalnego ryzyka dla płodu i konieczności stosowania antykoncepcji.