

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa dla kobiet stosujących produkt leczniczy WAYRILZ (rilzabrutynib)

964302

Imię i nazwisko lekarza prowadzącego leczenie:

Numer telefonu lekarza prowadzącego leczenie:

Ciąża

- Tego leku nie należy stosować w czasie ciąży. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas leczenia rilzabrutynibem, powinna natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym.
- Przed rozpoczęciem stosowania tego leku należy wykonać test ciążowy.
- Przed rozpoczęciem stosowania tego leku, pacjentka powinna zwrócić się do lekarza, jeśli jest w ciąży, podejrzewa, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko.

Antykoncepcja

- Nie wiadomo, czy rilzabrutynib wpływa na skuteczność hormonalnych leków antykoncepcyjnych.
- Należy stosować skuteczną metodę antykoncepcji w trakcie otrzymywania tego leku i w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, aby uniknąć zajścia w ciążę podczas leczenia.
- Należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu hormonalnych leków antykoncepcyjnych.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat bezpieczeństwa stosowania rilzabrutynibu, należy zapoznać się z ulotką dla pacjenta.