



File information	
GMID code:	696144
Plant PM code:	10046458
Second Plant PM code:	23001937
Version of artwork:	V3
PM type:	PI
Market:	PL
Format:	180 x 315 mm
Issue date of artwork:	04/Apr/2022
Print colors:	Pan 357
Number of print colors:	1
Used font:	Helvetica Neue LT / Gotham X Narrow
Min. font size:	9 pt
p2e number:	931880-U03

Technical colors	
Diecut-Legendcase	Free area
	Glue points



DulcoSoft Junior

Roztwór doustny Makrogol 4000



Należy uważnie zapoznać się z treścią tej instrukcji, ponieważ zawiera ważne informacje, które trzeba wziąć pod uwagę przed zastosowaniem produktu. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub dalszych pytań należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. DULCOSOFT®JUNIOR jest wyrobem medycznym do stosowania w objawowym leczeniu zaparc oraz do zmiękczenia twardych mas kałowych.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Spis treści ulotki:
1. Co to jest DULCOSOFT®JUNIOR i w jakim celu się go stosuje?
 2. Informacje ważne przed przyjęciem produktu DULCOSOFT®JUNIOR
 3. Jak przyjmować DULCOSOFT®JUNIOR
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać DULCOSOFT®JUNIOR
 6. Inne informacje

1. Co to jest DULCOSOFT®JUNIOR i w jakim celu się go stosuje?

Głównym składnikiem wyrobu medycznego DULCOSOFT®JUNIOR jest makrogol 4000, osmotyczny środek przeczyszczający. Makrogol 4000 wykazuje wysoką zdolność do wiązania wody. Stanowi nośnik płynu (wody) i opóźnia wchłanianie wody w jelitach, co prowadzi do zwiększenia jej ilości w okrężnicy. W okrężnicy następuje zmiękczenie twardych mas kałowych i zwiększenie objętości stolca. Prowadzi to do nasilenia perystaltyki jelit i ułatwia wypróżnienia. Łagodnie i skutecznie przeciwdziała zaparciom i reguluje wypróżnienia.

Macrogl 4000 wykazuje czysto fizyczny mechanizm działania; praktycznie nie jest wchłaniany przez organizm i ulega wydaleniu z kałem w postaci niezmięnionej. DULCOSOFT®JUNIOR jest stosowany w następujących wskazaniach:

- objawowe leczenie zaparc,
- zmiękczenie twardych mas kałowych,
- w ostrych i przewlekłych zaparciach.

2. Informacje ważne przed przyjęciem produktu DULCOSOFT®JUNIOR

Nie stosować produktu DULCOSOFT®JUNIOR w następujących przypadkach:

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych (zob. informacja o składzie).
 - Ciężka zapalna choroba jelit (taka jak wrzodziejące zapalenie jelit, choroba Leśniowskiego-Crohna) lub toksyczne rozdęcie okrężnicy.
 - Wystąpienie lub ryzyko wystąpienia perforacji przewodu pokarmowego.
 - Porażenna niedrożność jelit bądź też podejrzenie niedrożności jelit lub objawowego zwężenia jelit.
 - Brzuszne zespoły bólowe o nieokreślonej przyczynie.
- Nie stosować produktu DULCOSOFT®JUNIOR, jeśli występują powyższe objawy. W razie jakichkolwiek wątpliwości przed przyjęciem wyrobu medycznego DULCOSOFT®JUNIOR należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Kiedy zachować szczególną ostrożność

Podobnie jak w przypadku wszystkich środków przeczyszczających, przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć chorobę organiczną. Wyrobu medycznego DULCOSOFT®JUNIOR nie należy przyjmować codziennie w sposób ciągły przez dłuższy okres bez zbadania przyczyny zaparcia. W przypadku utrzymujących się bólów brzucha należy zwrócić się o poradę medyczną.

W przypadku biegunki należy zachować ostrożność u pacjentów podatnych na zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej (np. pacjentów w podeszłym wieku, osób z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek bądź też pacjentów stosujących leki moczopędne) i rozważyć monitorowanie stężeń elektrolitów. U pacjentów przyjmujących produkty zawierające makrogol mogą wystąpić stany alergiczne (takie jak wstrząs anafilaktyczny, reakcja anafilaktyczna, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, wysypka i nadwrażliwość).

W przypadku zauważenia u siebie któregokolwiek z powyższych objawów należy przestać stosować produkt DULCOSOFT®JUNIOR i natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Ciąża i karmienie piersią

DULCOSOFT®JUNIOR może być przyjmowany w ciąży lub w okresie karmienia piersią. Wchłanianie makrogolu 4000 jest pomijalne, dlatego nie powinien on wywierać wpływu na organizm. Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny jednak skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem wyrobu medycznego DULCOSOFT®JUNIOR.

Stosowanie u dzieci

Produkt nie powinien być stosowany u dzieci poniżej 6. miesiąca życia.

Stosowanie u chorych na cukrzycę

DULCOSOFT®JUNIOR może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę. Roztwór nie zawiera cukru.

DULCOSOFT®JUNIOR a inne produkty

Makrogol 4000 powoduje zwiększenie ciśnienia osmotycznego w jelitach, przez co może zmieniać wchłanianie leków innych produktów podawanych równocześnie. W przypadku przyjmowania innych produktów należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

Jeśli konieczne jest zagęszczenie płynów w celu ich bezpiecznego połknięcia, DULCOSOFT®JUNIOR może przeciwdziałać efektem zagęszczacza.

3. Jak przyjmować DULCOSOFT®JUNIOR

DULCOSOFT®JUNIOR należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w niniejszej ulotce dla pacjenta. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

DULCOSOFT®JUNIOR jest roztworem pozbawionym smaku. Produkt można mieszać bezpośrednio z wybranym napojem, np. ze szklanką wody, soku owocowego lub herbaty (około 150 ml).

Ze względu na mniejszą dawkę dzienną dla dzieci (poniżej 3 lat), ilość płynu można zmniejszyć do 50 ml (przy stosowaniu 8 ml roztworu) lub 100 ml (przy stosowaniu 16 ml roztworu). Zawsze należy zapewnić odpowiednią podaż płynów.

O ile lekarz nie przepisze inaczej, zazwyczaj stosowana dawka wynosi:

Dorośli i dzieci powyżej 8 lat:

20–40 ml roztworu na dobę (co odpowiada 10–20 g makrogolu 4000), najlepiej w pojedynczej dawce przyjmowanej rano.

W przypadku stosowania produktu u dzieci poniżej 8. roku życia należy skonsultować się z lekarzem.

Dzieci 4 - 7 lat:

16-32 ml roztworu na dobę (co odpowiada 8-16 g makrogolu 4000), najlepiej w pojedynczej dawce przyjmowanej rano.

Dzieci 2 - 3 lata:

8-16 ml roztworu na dobę (co odpowiada 4-8 g makrogolu 4000), najlepiej w pojedynczej dawce przyjmowanej rano.



NOTE:
For the Item Number:
The Barcode "Type 2D" (14 digits) fits with the Item Number

DulcoSoft Junior



Roztwór doustny Makrogol 4000

Dzieci powyżej 6. miesiąca do roku:

8 ml roztworu na dobę (co odpowiada 4 g makrogolu 4000), najlepiej w pojedynczej dawce przyjmowanej rano.

Dawkę należy odmierzyć przy użyciu miarki dołączonej do opakowania. Dawkę można dostosowywać w zależności od uzyskiwanego efektu. Uwzględniając zalecenia dotyczące dawkowania, dawkę można dostosować do własnych potrzeb i przyjmować codziennie lub co drugi dzień. Właściwą dawką jest najmniejsza dawka zapewniająca regularne oddawanie miękkich stolców.

Uwaga:

DULCOSOFT®JUNIOR zazwyczaj zaczyna działać po 24–72 godzinach stosowania. Badania kliniczne potwierdzają, że w przypadku regularnego przyjmowania produktu wypróżnienia zazwyczaj występują raz na dobę.

Jeżeli zaparcia będą się utrzymywać, należy zbadać ich przyczynę. Dzieci nie powinny stosować produktu DULCOSOFT®JUNIOR przez okres dłuższy niż 3 miesiące

Zastosowanie dawki większej niż zalecana

Zbyt duże dawki produktu DULCOSOFT®JUNIOR mogą spowodować biegunkę, bóle brzucha, wzdęcie brzucha i wymioty. Objawy te ustępują po przerwaniu leczenia lub zmniejszeniu dawki. Znaczna utrata płynów z powodu biegunki lub wymiotów może wymagać leczenia zaburzeń gospodarki elektrolitowej. W takiej sytuacji należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania produktu DULCOSOFT®JUNIOR

W przypadku pominięcia dawki produktu DULCOSOFT®JUNIOR nie wolno przyjmować podwójnej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Działania niepożądane mają na ogół charakter łagodny i przemijający.

Działania niepożądane u dorosłych i dzieci:

Biegunka, bóle brzucha, rozdęcie brzucha, nudności, wymioty, nietrzymanie kału i wzdęcia.

Rzadko mogą wystąpić: wstrząs anafilaktyczny, reakcja anafilaktyczna, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, wysypka, reakcja nadwrażliwości.

W przypadku biegunki, która zazwyczaj ustępuje po przerwaniu leczenia lub zmniejszeniu dawki, należy rozważyć kontakt z lekarzem, ponieważ może być konieczne leczenie zapobiegające utracie soli (elektrolitów) związanej z utratą płynów.


Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


5. Jak przechowywać DULCOSOFT®JUNIOR

Wyroby medyczne należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować produktu DULCOSOFT®JUNIOR po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Należy zużyć w ciągu 6 tygodni od otwarcia butelki.

 Przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się z instrukcją używania.

 25°C Nie przechowywać produktu DULCOSOFT®JUNIOR w temperaturze powyżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce.

6. Inne informacje

10 ml płynu DULCOSOFT®JUNIOR zawiera 5 g makrogolu 4000. Roztwór jest dostępny w opakowaniach po 100 ml.

Pozostałe składniki: sorbinian potasu (środek konserwujący), makrogol 400, kwas cytrynowy, woda oczyszczona

CE0482

 Hälsa Pharma GmbH
Maria-Goeppert-Straße 5
D-23562 Lübeck

Dystrybutor: Opella Healthcare Poland Sp. z o. o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa

Z dołączoną miarką
Producent miarki:
Bormioli Pharma S.p.A.
Corso Magenta 84
20123 Milano (MI)
Włochy

CE0373

Data aktualizacji: 03.2023 r.

Dodatkowe informacje:

- Odpowiedni dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią oraz dzieci powyżej 6. miesiąca życia.
- Odpowiedni dla osób chorych na cukrzycę: płyn nie zawiera cukru.
- Odpowiedni dla pacjentów stosujących dietę niskosodową.
- Nie zawiera sodu
- Nie zawiera glutenu
- Nie zawiera cukru
- Nie zawiera laktozy.
- Neutralny smak, mieszać z dowolnym napojem
- Nie zawiera glutenu, laktozy, cukru
- Neutralny smak / bez dodatku substancji smakowych/Bez smaku
- Rozpuścić w dowolnym napoju
- Łagodzi zaparcia
- Zmiękcza twarde masy kałowe
- Uwadnia i zmiękcza twarde, suche masy kałowe
- Łagodnie pobudza perystaltykę
- Współpracuje z organizmem, przynosząc przyjemną ulgę w zaparciach
- Łagodnie i skutecznie przeciwdziała zaparciom i reguluje wypróżnienia
- Idealny do łagodnej stymulacji wypróżnień w ciągu dnia
- Praktycznie nie powoduje bolesnych skurczów
- Praktycznie nie daje uczucia nagłego parcia na stolec
- Powyżej 6. miesiąca życia
- Łagodny środek przeczyszczający
- Naturalnie współpracuje z organizmem łagodząc zaparcia i regulując wypróżnienia
- Naturalne uczucie ulgi
- Należy rozcieńczyć

23001937

sanofi